

FLIRT NOVÝ®

Účinné látky: 325 g/l chloridazon, 100 g/l chinmerak

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě

Balení: 4 x 5l
Registrační číslo: 5040-0
Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
Formulace: suspenzní koncentrát

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Flirt Nový vniká do rostliny kořeny a listy. Při ošetření před vzejitím je přijímán kořeny klíčících plevelů, které ještě před vzejitím nebo krátce po něm zahynou. Po vzejití řepy je přijímán kořeny a listy plevelů a má naději na úspěch jen tehdy, mají-li plevele vytvořeny děložní, nejvýše však 2 pravé listy.

Včasný výsev a stejnoměrně připravená půda bez hrud s dobře uzavřeným povrchem jsou předpokladem pro dobrý účinek přípravku. Vytvoří-li se půdní škraloup, nutno ho rozrušit do 3–4 dnů před vzejitím, aby se klíčící rostliny řepy nepoškodily.

REGISTROVANÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Preemergentní ošetření:

Citlivé plevele: svízel přítula.

Méně citlivé plevele: tetluha kozí pysk, heřmánky, hluchavky, penízek rolní, ohnice polní, kokoška pastuší tobolka.

Postemergentní ošetření:

Citlivé plevele: penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, svízel přítula, hluchavky.

Méně citlivé plevele: laskavce, malé kopřivy, ptačinec žabinec, tetluha kozí pysk, lilek černý.

REGISTROVANÁ APLIKACE

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka l/ha	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka, krmná řepa	svízel přítula	2,5	AT	preemergentně; max. 1x
Cukrovka, krmná řepa	jednoleté dvouděložné plevele	0,83 l/ha + 0,15 l/ha Outlook – TM 1. aplikační termín 0,83 l/ha + 0,3 l/ha Outlook – TM 2. aplikační termín 0,83 l/ha + 0,45 l/ha Outlook – TM 3. aplikační termín	90	postemergentně; max. 3x

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Preemergentní ošetření se provádí bezprostředně po zasetí plodiny, max. 1x.

Postemergentní aplikace:

Růstová fáze plodiny: BBCH 10-31

Růstová fáze plevelů: BBCH 10, tj. děložní listy – BBCH 12, tj. 2 pravé listy

Aplikuje se max. 3x 0,83 l/ha, vždy po vzejití nové plevelné vlny, v TM s přípravkem Outlook.

Interval mezi aplikacemi: 6–14 dní

DÁVKA VODY

200–300 l/ha

MÍSITELNOST

Přípravek Flirt Nový je mísitelný s běžně používanými herbicidy proti dvouděložným plevelům v cukrovce.

OMEZUJÍCÍ ÚDAJE

Riziko pro vodní organismy	SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
	SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
Riziko pro životní prostředí	SPe1	Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chloridazon a chinmerak vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
Ochranná pásma vod	OP II.st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.