

WUXAL® BORON PLUS

Složení:

70 g/l N, 183 g/l P₂O₅, 108 g/l B
a plně chelatizované stopové prvky Cu, Fe, Mo, Mn, Zn
v množství odpovídajícím fyziologickým potřebám rostlin

Wuxal Boron Plus je vysoce koncentrované borové hnojivo obsahující plně chelatizované stopové živiny pro plodiny s vysokým nárokem na obsah boru jako je cukrovka, řepka olejka, ovoce a zelenina. Wuxal Boron Plus má stimulační účinek na rostliny, které jsou ve fyziologickém stresu v časných fázích růstu a je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin. Výsledkem je vyšší výnos a vyšší kvalita úrody. Wuxal Boron Plus vyrovnává pH aplikační kapaliny na úroveň, která je pro rostliny fyziologicky dobře přijatelná.

Wuxal Boron Plus obsahuje speciální aditiva, která zaručují dobrou odolnost vůči dešti a vynikající přilnavost i za nepříznivých klimatických podmínek.

Aby se dosáhlo zlepšení účinku aplikovaného hnojiva, aplikovat třeba brzy ráno, skoro večer nebo za oblačného počasí.

Balení: 10l

DOPORUČENÍ K APLIKACI

Plodina	Dávka	Poznámka
Cukrová řepa pro vyšší úrody cukru a na podporu odolnosti proti suché hniloba a hnilobě srdíčka řepy	1–2 l/ha	2 aplikace – ve fázi 4–6 listů – krátce před zapojením porostu
Řepka olejka pro vyšší úrodu oleje a na podporu dobrého vývinu šesňulí a semen	1–2 l/ha	2 aplikace – prodlužovací růst – ve stadiu butonizace až do začátku kvetení
Kukuřice pro zvýšení výnosu i kvality úrody kukuřice	1–2 l/ha	1–2 aplikace – na začátku růstu, ve stádiu 4–5 listů – na začátku prodlužovacího růstu, v stadiu 7–9 listů
Slunečnice pro zvýšení výnosu	1 l/ha	1–2 aplikace – před květem
Jádroviny podpora kvetení a zvýšení jemnosti slupky plodů	1 l/ha	3 aplikace – kvetení – stádium růstu – po sklizni

Plodina	Dávka	Poznámka
Peckoviny pro lepší nasazení květů a podporu kvetení Réva vinná – proti opadu květů a mladých plodů	1–2 l/ha	2 aplikace – začátek plného květu – po sklizni
Réva vinná proti opadu květů a mladých plodů	1–2 l/ha	2 aplikace – před květem – na konci kvetení
Zelenina (zelí, mrkev, celer, fazole, hrách, ředkvička, salát hlávkový) – zvýšení kvality	1–2 l/ha	2–3 aplikace – obecně 2–3 týdny po přesazení – opakovat v 8–10 denních intervalech – zelí: ve stádiu 4–6 listů, na počátku tvorby hlávky

MÍSITELNOST

I když Wuxal Boron Plus je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, doporučujeme provést test mísitelnosti, zvláště když směs připravujete poprvé.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

pH koncentráту: 5,2; 1% roztok ve vodě má hodnotu pH 6,8