



novinka

Přípravky firmy Agro Alliance



## Nejekonomičtější jarní ošetření řepky proti plevelům

Účinná látka:

Clopyralid 200 g/l

### Přednosti

- Hubí heřmánkovité plevele, pcháč oset, smetanku lékařskou aj. díky účinné látce clopyralid
- Vysoce selektivní pro kulturní plodiny
- Flexibilní dávkování 0,5–1,0 l/ha dle spektra a vývojové fáze plevelů
- Aplikujte na aktivně rostoucí plevele při teplotách nad 12 °C
- Cenově nejvýhodnější jarní ošetření řepky

### Působení přípravku

Vivendi 200 působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst a postupně ztrácejí svoji přirozenou barvu. Listy a stonky se deformují a v průběhu 10–21 dnů po aplikaci odumírají.



20 let na trhu

## Citlivé plevele

pcháč oset, rmen rolní, heřmánky, heřmánkovec přímořský, kopretina osenní, turanka kanadská, lopuch, podběl lékařský, pelyněk černobýl, chrpa modrák, výdrol slunečnice a další složnokvěté plevele, rdesna, pohanka svačkovitá, regenerující vojtěška setá, jeteloviny, lilek černý, tetluha kozí pysk, mrkvous obecný, atd.



## Registrované použití

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka l/ha	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves	plevele dvouděložné jednoleté	0,35 max. 1x	AT	na jaře; od BBCH 12 do BBCH 32; dávka vody 200–400 l/ha
Řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní	plevele dvouděložné, pcháč oset	0,5–1,0 max. 2x; do celkové dávky 1,5 l/ha	AT	na jaře; od BBCH 12 do BBCH 50 dávka vody 200–400 l/ha
Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, mangold, tuřín, vodnice	plevele dvouděložné, pcháč oset	0,5–1,0 max. 2x; do celkové dávky 1,5 l/ha	42	od BBCH 10 do BBCH 39 dávka vody 80–400 l/ha
Louky a pastviny	plevele dvouděložné, pcháč oset	1,0 max. 1x	7	neaplikovat v roce výsevu; dávka vody 300–400 l/ha
Okrasné rostliny	plevele dvouděložné, pcháč oset	1,0 max. 1x	7	dávka vody 200–400 l/ha



## Doporučení pro aplikaci

Aplikace provádějte na aktivně rostoucí plevele tzn. počkejte, až průměrné denní teploty budou opravdu dosahovat 12°C, s aplikací zbytečně nespěchejte! Přípravek je vysoce selektivní k registrovaným plodinám.

### Ošetření řepky olejky, cukrovky, krmné řepy, červené řepy, mangoldu, tuřínu a vodnice:

Přípravek aplikujte na jaře v dávce 0,5 l/ha proti jednoletým plevelům (heřmánkovité, apod.). V případě výskytu pcháče osetu lze oca za 3–4 týdny provést následnou aplikaci v dávce 1,0 l/ha. Za vegetace je tedy možné provést maximálně 2 aplikace do celkové dávky 1,5 l/ha Vivendi 200. Pcháče by měly být v době 1. postřiku ve fázi listové růžice.