



novinka

Přípravky firmy Agro Aliance



Nejekonomičtější jarní ošetření řepky proti plevelům

Účinná látka:

Clopyralid 200 g/l

Přednosti

- Hubí heřmánkovité plevele, pcháč oset, smetanku lékařskou aj. díky účinné látce clopyralid
- Vysoce selektivní pro kulturní plodiny
- Flexibilní dávkování 0,5–1,0 l/ha dle spektra a vývojové fáze plevelů
- Aplikujte na aktivně rostoucí plevele při teplotách nad 12 °C
- Cenově nejvýhodnější jarní ošetření řepky

Působení přípravku

Vivendi 200 působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst a postupně ztrácejí svoji přirozenou barvu. Listy a stonky se deformují a v průběhu 10–21 dnů po aplikaci odumírají.



20 let na trhu

Citlivé plevele

pcháč oset, rmen rolní, heřmánky, heřmánkovec přímořský, kopretina osenní, turanka kanadská, lopuch, podběl lékařský, pelyněk černobýl, chrpa modrák, výdrol slunečnice a další složnokvěté plevele, rdesna, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá, jeteloviny, lilek černý, tetluha kozí pysk, mrkvous obecný, atd.



Registrované použití

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka l/ha	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves	plevele dvouděložné jednoleté	0,35 max. 1x	AT	na jaře; od BBCH 12 do BBCH 32; dávka vody 200–400 l/ha
Řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní	plevele dvouděložné, pcháč oset	0,5–1,0 max. 2x; do celkové dávky 1,5 l/ha	AT	na jaře; od BBCH 12 do BBCH 50 dávka vody 200–400 l/ha
Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, mangold, tuřín, vodnice	plevele dvouděložné, pcháč oset	0,5–1,0 max. 2x; do celkové dávky 1,5 l/ha	42	od BBCH 10 do BBCH 39 dávka vody 80–400 l/ha
Louky a pastviny	plevele dvouděložné, pcháč oset	1,0 max. 1x	7	neaplikovat v roce výsevu; dávka vody 300–400 l/ha
Okrasné rostliny	plevele dvouděložné, pcháč oset	1,0 max. 1x	7	dávka vody 200–400 l/ha



Doporučení pro aplikaci

Aplikace provádějte na aktivně rostoucí plevele tzn. počkejte, až průměrné denní teploty budou opravdu dosahovat 12°C, s aplikací zbytečně nespěchejte! Přípravek je vysoce selektivní k registrovaným plodinám.

Ošetření řepky olejky, cukrovky, krmné řepy, červené řepy, mangoldu, tuřínu a vodnice:

Přípravek aplikujte na jaře v dávce 0,5 l/ha proti jednoletým plevelům (heřmánkovité, apod.). V případě výskytu pcháče osetu lze cca za 3–4 týdny provést následnou aplikaci v dávce 1,0 l/ha. Za vegetace je tedy možné provést maximálně 2 aplikace do celkové dávky 1,5 l/ha Vivendi 200. Pcháče by měly být v době 1. postřiku ve fázi listové růžice.