

Účinná látka
69 g.l⁻¹ fenoxaprop-P-ethyl

Obsahuje safener
mefenpyr-diethyl, ktorý
chráni porasty obilnín pred
negatívnymi účinkami.

Plodina	Účel použitia	Dávka l.ha ⁻¹	Ochr. doba	Poznámka
jačmeň jarný pšenica jarná pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1,0	AT	
jačmeň jarný pšenica jarná	ovos hluchý odolné 2kl. buriny, lipkavec	0,8-1,0 + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý odolné 2kl. buriny, lipkavec	0,8-1,0 + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka	1,0	AT	
pšenica ozimná raž siata	metlička, psiarka, odolné 2kl. buriny, lipkavec	1,0 + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

Príjem herbicídu: výhradne prostredníctvom zelených častí rastlín a je transportovaný aj do koreňov a rhizómov, kde pôsobí na rastové pletivá. Zasiahnuté trávy počas 2-3 dní prestávajú rásť a nevytvárajú nové listy.

Spôsob účinku: kontaktný a systémový účinok

Dávka vody: 200-300 l.ha⁻¹

DUKE nepôsobí na pýr plazivý, mätonohy, stoklasy, lipnice a dvojkličnolistové buriny.

Citlivé buriny



Ježatka kuria



Metlička obyčajná



Ovos hluchý



Psiarka roľná



Prstovka krvavá



Mohár zelený

DUKE®

Odporúčania pre aplikáciu

- ✓ Prípravok je možné aplikovať od 3 listov:
 - v **pšenici ozimnej/jarnej** až do objavenia druhého kolienka,
 - v **raži siatej** ošetríte do objavenia 1. kolienka,
 - v **jarnom jačmeni** najneskôr do konca odnožovania.
- ✓ Najlepší účinok dosiahnete skorou aplikáciou, keď sú trávovité buriny v aktívnom raste od 3 listov až do konca odnožovania (max. do fázy 1. kolienka).
- ✓ Ošetríte v čase, keď sú všetky trávovité buriny vzídené a majú vyvinutú dostatočnú listovú plochu.
- ✓ Na odnožené trávovité buriny je nutné použiť plnú dávku $1,0 \text{ l.ha}^{-1}$, najlepšie v kombinácií so zmáčadlom **Gondor** v dávke $0,25 \text{ l.ha}^{-1}$.

Ovos hluchý vo fáze odnožovania ošetríme dávkou $0,8 \text{ l.ha}^{-1}$, úplne odnožený ovos regulujeme vyššou dávkou $1,0 \text{ l.ha}^{-1}$. Ovos je citlivý až do štádia 1-2 kolienok, v tomto štádiu odporúčame použitie zmáčadla **Gondor**.

Neodporúčame použitie DUKE s hnojivom DAM 390!!!

Neaplikujte za intenzívneho slnečného svitu ani v dobe keď hrozia nočné mrazy!
Aplikácia po daždi by mala nasledovať za 2-3 dni až sa na listoch obnoví vosková vrstvička!

DUKE sa neodporúča aplikovať v ozimnom jačmeni a ovse siatom!

Miešateľnosť:

- ✓ **Grodyl 75 WG** ($15-30 \text{ g.ha}^{-1}$) alebo Starane Forte - rozšírenie spektra účinku na dvojkličnolistové buriny (lipkavec obyčajný).
- ✓ Rastové regulátory na báze CCC - **Celstar 750 SL** a trinexapak-etylu - **Proteg**.
- ✓ Na podporu regenerácie porastov obilnín je vhodné miešať s hnojivom **Wuxal SUS Kombi Mg** v dávke $3-5 \text{ l.ha}^{-1}$.

Ing. Ján Gajdoš
+421 915 781 289

Ing. Tomáš Vereš, PhD.
+421 905 888 832

Tricolor s.r.o.
+421 905 316 417; 418

