

2
0
1
8



Vivendi[®] 200

Venzar[®] 500 SC

Wuxal[®] Boron Plus

Wuxal[®] Sulfur

Cukrová repa ochrana a listová výživa

Prípravky firmy Agro Aliance SK

*Šetríme Vaše
peniaze!*

S VAMI, PRE VÁS

Fenifan

Phenmedipham 160 g.l⁻¹

- kontaktný herbicíd proti bežným jednoročným dvojkličnolistovým burinám
- účinkuje na horčicu, pastiersku kapsičku, mrlíky, lobodu, reďkev, peniažtek, hviezdicu, atď.
- prípravok vhodný do všetkých aplikácií (T1, T2, T3)
- prípravok je registrovaný pre použitie s TM komponentami do repy
- dávka T1 2,5-3,0 l.ha⁻¹, T2 a T3 1,5 l.ha⁻¹ (bez ohľadu na vývojové štádium repy)
- dávka 2,0-6,0 l.ha⁻¹ (max 6,0 l.ha⁻¹ za rok)

Mix Double EC

Desmedipham 160 g.l⁻¹

Phenmedipham 160 g.l⁻¹

- kontaktné pôsobenie
- účinok proti bežným dvojkličnolistovým burinám (mrlíky, lobody, kapustovité buriny)
- vynikajúci účinok i na láskavce
- možné kombinácie so Stematom Super
- dávka 0,5-0,6 l.ha⁻¹ (základ pravých listov)
- dávka 0,8-1,0 l.ha⁻¹ (vyvinuté min. 2 pravé listy cukrovej repy)
- dávka 1,0-1,5 l.ha⁻¹ (vyvinuté min. 4 pravé listy cukrovej repy)
- dávka 1,5-3,0 l.ha⁻¹ (šesť pravých listov)
- nemiešať s insekticídmi !!!

Stemat Super

Ethofumesate 500 g.l⁻¹

- herbicíd s listovým i pôdnym účinkom
- účinkuje predovšetkým na lipkavec obyčajný, horčičky, bažanku ročnú, hviezdicu prostrednú a v skorých rastových fázach aj na niektoré jednokličnolistové buriny
- dávkovanie 0,2-2 l.ha⁻¹
- dávku do 0,2 l.ha⁻¹ možno aplikovať vo všetkých rastových fázach cukrovej repy

Rango Super

Quizalofop-P-tefuryl 40 g.l⁻¹

- postemergentný herbicíd so systémovým účinkom
- účinok proti jednoročným a vytrvalým trávam (cirok alepský, ježatka kuria, ovos hluchý, proso siate, prstovka, pýr plazivý a iné trávy)
- dávkovanie - jednoročné trávy 1-1,5 l.ha⁻¹ (od dvoch listov)
- pýr 2-2,5 l.ha⁻¹



Destor

Desmedipham 160 g.l⁻¹

- kontaktný herbicíd na postemergentnú aplikáciu v repe cukrovej, repe kýmnej a v cvikle proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám
- účinkuje na láskavec ohnutý, kapsičku pastiersku, mrlík figolistý, mrlík biely, hluchavku purpurovú, hviezdicu prostrednú, fialku roľnú, atď.
- optimálne účinky dosiahnete keď sú buriny vo fáze tvorby prvého kľúčneho listu (BBCH 10)
- maximálny počet aplikácií 2x v plodine (max. 3 l prípravku)
- aplikujte najneskôr v BBCH 31
- interval medzi aplikáciami 5-14 dní, po vzídení novej vlny burín
- nepostrekujte keď sa očakáva dážď, keď sú listy mokré, prší alebo mrholí
- pri kombinácii s inými úč. látkami DESTOR dávajte do roztoku ako posledný
- dávka 0,5-3,0 l.ha⁻¹

Pyramin Turbo

Chloridazon 520 g.l⁻¹

- herbicídny prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu, určený na ničenie jednoročných a dvojkličnolistových burín v cukrovej a kýmnej repe do rastliny vniká koreňmi a listami
- možnosť aplikácie: pred sejbou, pred vzídením, po vzídení
- účinkuje najmä proti horčici, reďkvi, kolencu, žltnici, veronike, horčičkom, rumančekom, lobodám, hluchavkám, hviezdici, mrlíkom, peniažtekom, atď.
- možnosť kombinácie s ostatnými prípravkami do repy
- dávka 4,1-5,0 l.ha⁻¹
- odporúčame v ošetrovaní T1 dávku 1,0 l.ha⁻¹, v ošetrovaní T2 a T3 dávku 2,0 l.ha⁻¹

HERBICÍDY A FUNGICÍDY

Vivendi 200

Clopyralid 200 g.l⁻¹

- selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie odolných dvojkľúčolistových burín, **hlavne rumanov, rumančekov a pichliača roľného**
- účinná látka je prijímaná listami a byľami rastlín, následne prenášaná do koreňov
- buriny krátko po postreku zastavujú rásť, blednú, skrúcajú sa v priebehu 10-21 dní hynú
- ostatné citlivé buriny – púpava lekárska, chryzantémovka siatinová, starček obyčajný a ďalšie buriny z čeľade astrovité, mlieč zelinný
- optimálna aplikácia proti pichliaču je v rastovej fáze prízemnej ružice listov do začiatku predlžovania byle
- aplikujeme jednorázovo v dávke 0,5 l.ha⁻¹, repa musí mať viac ako dva páry pravých listov (BBCH 14)
- možná aplikačná dávka VIVENDI 200 v kombináciach s prípravkami na báze PHE, DMP, ETH, LEN je v T2 0,2-0,3 l.ha⁻¹, T3 0,2-0,3 l.ha⁻¹
- je možné použiť olejové zmáčadlá, ak vosková vrstvička na listoch c. repy nebola poškodená,
- dávka vody 80-400 l.ha⁻¹

Eminent 125 ME

Tetraconazole 125 g.l⁻¹

- systémový fungicíd vo forme mikroemulzie
- repu ošetríme pri prvých príznakoch chorôb
- výborný účinok proti cerkospóre repovej a múčnatke repovej
- preventívne, kuratívne a eradikatívne pôsobenie
- veľmi vysoká a dlhá doba účinnosti
- veľmi dobrý účinok na novonarastené časti rastliny
- dávkovanie 0,8 l.ha⁻¹

Venzar 500 SC

Lenacil 500 g.l⁻¹

- herbicíd s dlhodobým pôdnym účinkom
- použitie hlavne na letné zaburinenie
- možné kombinácie s prípravkami na báze PMP/DMP, Safari 50 WG a ETH
- dávka 0,25-0,5 l.ha⁻¹
- celková dávka prípravku nesmie prekročiť 1,0 l.ha⁻¹ za sezónu

POMOČNÉ LÁTKY A MOLUSKOCÍDY

Gondor

Lecitin 495 g.l⁻¹

- adjuvant pre použitie v zmesi s herbicídmi a regulátormi rastu
- registrácia vo všetkých plodinách, na ornej, lesnej a nepoľn. pôde vrátane železníc
- zvyšuje príľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi
- zvyšuje penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov
- znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi
- dávka 0,25-0,4 l.ha⁻¹, (max konc. 0,25 %)
- dávka vody: 100-200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,25 l.ha⁻¹ nad 200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,4 l.ha⁻¹
- **pri príprave postrekovej zmesi dávajte adjuvant prvý**



Metarex Inov

Metaldehyde 40 g.kg⁻¹

- moluskocíd vo forme granulovanej návnady na ničenie slimákov a slizniakov
- registrovaný na ochranu poľných plodín, zeleniny, ovocia, okrasných rastlín a skleníkových plodín
- účinok peliet sa prejaví počiatočným znehybnením slimákov a ich následným úhynom
- najlepšie výsledky sa dosiahnu pri aplikácii počas mierneho vlhkého počasia
- spôsob aplikácie:
 - zapracovaním do pôdy pri sejbe 4 kg.ha⁻¹
 - povrchovým rozmetaním alebo do riadkov 5 kg.ha⁻¹
- ochranné ošetrovanie je nutné urobiť skôr, ako škodca poškodí nadzemné časti rastlín
- maximálna dávka 17,5 kg.ha⁻¹ /na plodinu/ za rok alebo vegetačné obdobie
- prípravok je vysoko odolný voči vplyvom počasia
- monitoring je potrebné začať čo najskôr (pred sejbou resp. výsadbou) a pokračovať v ňom počas citlivých rastových fáz plodiny.
- prípravok obsahuje repelenty odpudzujúce domáce zvieratá

ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE PRE OŠETRENIE CUKROVEJ REPY

APLIKÁCIA T-1

ZÁKLADNA KOMBINÁCIA		DOPLNENIE KOMBINÁCIE	
PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
FENIFAN®	3,0	PYRAMIN® TURBO	1,0
STEMAT® SUPER	0,2	GONDOR®	0,25
MIX DOUBLE® FL	0,5 - 0,6	PYRAMÍN® TURBO	1,0
STEMAT® SUPER	0,2		

APLIKÁCIA T-2

ZÁKLADNA KOMBINÁCIA		DOPLNENIE KOMBINÁCIE	
PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
MIX DOUBLE® FL	1,0 - 1,3	PYRAMIN® TURBO	2,0
STEMAT® SUPER	0,2 - 0,4	FENIFAN®	1,5
GONDOR®	0,25	DESTOR®	0,3 - 2,0
		VENZAR® 500 SC	0,25 - 0,5
		VIVENDI® 200	0,2 - 0,3
		RANGO® SUPER	1,5 - 2,5
		EMINENT® 125 ME	0,8
		BORONIA®	3,0
		WUXAL® SUS BORON	2,5 - 5,0
		WUXAL® BORON PLUS	1,0 - 2,0

APLIKÁCIA T-3

ZÁKLADNA KOMBINÁCIA		DOPLNENIE KOMBINÁCIE	
PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
MIX DOUBLE® FL	1,3 - 1,6	PYRAMIN® TURBO	2,0
STEMAT® SUPER	0,4 - 0,6	FENIFAN®	1,5
GONDOR®	0,25	DESTOR®	0,5 - 3,0
		VENZAR® 500 SC	0,3 - 0,5
		VIVENDI® 200	0,2 - 0,3
		RANGO® SUPER	1,5 - 2,5
		EMINENT® 125 ME	0,8
		BORONIA®	3,0
		WUXAL® SUS BORON	2,5 - 5,0
		WUXAL® BORON PLUS	1,0 - 2,0





Wuxal Sulfur

Zloženie: celkový N 15 %, SO_3 52,5 %, B 0,01 %, Cu 0,004 %, Fe 0,02 %, Mn 0,012 %, Mo 0,001 %, Zn 0,004 %, katióny Cu, Fe, Mn a Zn sú vo forme chelátu s EDTA

- špeciálne listové hnojivo s vysokým obsahom síry, dusíka a mikroživín
- toto zloženie živín je obzvlášť dôležité pre syntézu proteínov, lebo ako síra aj dusík sú obsiahnuté v aminokyselinách
- síra a dusík sú známe svojim synergickým účinkom na metabolizmus rastlín
- síra je dôležitá pre zlepšenie odolnosti rastlín voči chorobám
- dávka 3,0-5,0 l.ha⁻¹
- aplikujeme 1-2x za sezónu

Wuxal Boron Plus

Zloženie: N 5,0 %, P_2O_5 13,0 %, Bór 7,7 %, Mn 0,05 %, Zn 0,05 %, Mo 0,01 %, Cu 0,05 %, Fe 0,1 %

- vysokokonzentrované hnojivo s obsahom bóru a iných mikroživín
- zvýšenie cukornatosti
- podpora odolnosti proti suchej hnilobe a hnilobe srdiečka repy
- špeciálna formulácia zvyšuje príjem a účinnosť obsiahnutých živín
- aplikujeme 2x za sezónu (vo fáze štyroch až šiestich listov a krátko pred zapojením porastu)
- dávka 1,0-2,0 l.ha⁻¹



Wuxal Microplant

VITAMÍNOVÁ BOMBA!

Zloženie: N celkový 5 %, K_2O 10 %, MgO 3 %, B 0,3 %, Cu 0,5 %, Fe 1,0 %, Mn 1,5 %, Mo 0,01 %, Zn 1,0 %, SO_3 5,2 %, katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

- vysoké zastúpenie mikroprvkov
- zvyšuje odolnosť voči stresu
- vhodný do všetkých plodín
- rýchle doplnenie akéhokoľvek deficitu vo výžive
- dávka 1-2 l.ha⁻¹, aplikáciu možno opakovať 2-3x

Microstar PMX

Zloženie: N 10 %, P_2O_5 45 %, SO_3 12 %, Zn 0,029 %, B 0,028 %, Cu 0,01 %, Mn 0,019 %, Mo 0,005 %

- mikrogranulát zabezpečujúci rýchly štart rastu rastlín
- dostatok pohotových živín v prvých týždňoch a mesiacoch
- má výrazný vplyv na úrodu
- jednoduchá manipulácia a nízke dávkovanie
- využiteľnosť živín je oveľa vyššia v porovnaní s klasickými hnojivami
- lepšie prekonávanie stresu v prípade nepriaznivých klimatických podmienok (časté striedanie teplôt v priebehu jari)
- dávka 20,0 kg.ha⁻¹

Boronia

Zloženie: B 10,9 % (150 g.l⁻¹), molybdén 0,02 %

- rýchle doplnenie nedostatku bóru
- zvyšuje cukornatosť
- ochrana pred srdiečkovou hnilobou
- možné TM aplikácie s pesticídmi
- dávka 3,0 l.ha⁻¹ (vodorozpustný bór)
- 1. aplikácia na začiatku vývoja repy
- 2. aplikácia na dobre vyvinuté listy





Táto publikácia má informatívny charakter. Pri práci s prípravkami a hnojivami dodržujte pokyny uvedené na etiketách.
Termín uzávierky pre tlač: 20. 11. 2017.

Poradenstvo

Ing. Ján Gajdoš

Hlavná 79
925 28 Pusté Úľany
mobil: 0915 781 289
e-mail: j.gajdos@agroaliance.sk

Ing. Tomáš Vereš, PhD.

Hájska 6
949 01 Nitra
mobil: 0905 888 832
e-mail: t.veres@agroaliance.sk

Tricolor, s.r.o.

Piešťanská 659
956 05 Radošina
mobil: 0905 316 418, 417
e-mail: tricolor@wircom.sk