

WUXAL® SUSPENSION KOMBI Mg**HNOJIVO ES**

Typ hnojiva: C.2.1 Hnojivo NK – suspenzní, 20-15 (4 MgO) se stopovými živinami

Obsah živin:

% hmotnostní	živina
20,0 %	N - Dusík - celkový (300 g/l)
4,3 %	- dusičnanový dusík (64 g/l)
15,2 %	- močovinový dusík (228 g/l)
15 %	draslík jako vodorozpustný K ₂ O (225 g/l)
4 %	hořčík jako vodorozpustný MgO (60 g/l)
0,02 %	B vodorozpustný - bor (0,30 g/l)
0,05 %	Cu vodorozpustná - měď v chelátu s EDTA (0,75 g/l)
0,1 %	Fe vodorozpustné - železo v chelátu s EDTA (1,50 g/l)
0,05 %	Mn vodorozpustný - mangan v chelátu s EDTA (0,75 g/l)
0,001 %	Mo vodorozpustný - molybden (0,015 g/l)
0,05 %	Zn vodorozpustný - zinek v chelátu s EDTA (0,75 g/l)
0,3952 %	obsah biuretu max.

Čistá hmotnost: 15 kg

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landsr. 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.

Pokyny pro použití:

NK suspenzní hnojivo s hořčíkem a stopovými prvky (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pro použití zejména ve chmelu, polních plodinách, ovocnářství, ve vinné révě, v okrasných rostlinách a zelenině.

Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Objem balení: 10 L.

Dávkování a podmínky používání:

Wuxal SUS Kombi Mg je vysoce koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pro aplikaci na list. Hnojivo je možné použít ve všech polních plodinách, v ovocnářství, zelinářství i v okrasném zahradnictví, obzvláště tehdy, kdy je v půdě k dispozici dostatečná zásoba fosforu a rostliny mají zvýšené nároky na hořčík. Může být použit jak preventivně, tak i kurativně, po projevení se příznaků nedostatku hořčíku.

V obilninách je vhodné použít Wuxal SUS Kombi Mg – 2-4x a to v období od odnožování až do metání, dávka 3-5 l/ha.

V kukuřici se hnojivo aplikuje 3x v období mezi fází 2-11 listů, dávka 3-5 l/ha.

V bramborách se aplikuje 3x, poprvé počátkem tvorby pupat (fáze 50), opakuje se počátkem květu a 14 dní poté. Dávka 5 l/ha.

V cukrovce a krmné řepě se aplikuje 3-5x od fáze 4 listů do uzavření řádků, dávka 5 l/ha.

Zelinářství – aplikuje se v koncentraci 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) podle potřeby v kombinaci s běžnými pesticidy.

Okrasné rostliny – aplikuje se v koncentraci 0,05 – 0,1 % (50 – 100 ml na 100 l vody) v kombinaci s běžně používanými pesticidy. V mladších rostlinách a kulturách s měkkými, jemnými listy je vhodné použít spodní hranici uvedené koncentrace.

Chmel – v koncentraci 0,15 % se kombinuje s ošetřením proti peronospoře. Při použití úsporných postřiků nesmí koncentrace převýšit 0,3%. Při zvýšené potřebě dávkování zinku lze Wuxal Sus Kombi Mg používat ve směsi se síranem zinečnatým (0,2%). Ošetřuje se 2-4x. Ošetření lze rovněž kombinovat s Wuxalem Super (3-5 l/ha).

Ovocnářství – aplikace 2-3x v dávce 3-5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy, poprvé v růstové fázi těsně před vytvořením růžového poupěte (E2). V jabloních se v době po odkvětu doporučuje přejít na Wuxal SUS Kombi Ca.

Vinařství – aplikace v dávce 3-5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy proti peronospoře, celkem 5x.

Mísitelnost, příprava postřiku:

Hnojivo je třeba v obalu nejprve pečlivě rozmíchat a poté se vlije přes sítko do nádrže a spláchne vodou. Při rozpouštění je třeba udržovat míchadlo neustále v činnosti. Hnojivo lze rovněž přímo v obalu či v pomocné nádobě rozmíchat s vodou a vpravit do nádrže. Poté se za míchání doplní vody na stanovený objem.

Při přípravě směsí s pesticidy se do nádrže vždy vpraví jako první Wuxal a teprve poté se předepsaným postupem dávákuje příslušný pesticid.

Hnojivo je fyzikálně a chemicky mísitelné s fungicidy i insekticidy, běžně se nacházejícími na trhu, nedoporučujeme jej však používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeauxské nebo sírovápenaté jíchy a s polysulfidy. Wuxal SUS Kombi Mg nedoporučujeme mísit s Wuxalem SUS Boron a Wuxalem Super. Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí Wuxal s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

Pokyny pro skladování a manipulaci:

Hnojivo je třeba, skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte produkt před mrazem, teplotami pod +5°C a nad 40°C, častými změnami teplot, znečištěním a vyschnutím. Neuchovávejte v kovových obalech (riziko koroze). I krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5°C může dojít ke změně barvy a vyloučení krystalů. Tato skutečnost není na závadu jeho jakosti, při přípravě aplikační kapaliny dojde ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobku při teplotách okolo 20°C za občasného promíchání či protřepání.

Bezpečnostní opatření:

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením oka odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým

informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138

OZNAČENÍ:

Hnojivo není ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů klasifikováno jako nebezpečná směs.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje: kyselina boritá