

## Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně řepky olejky proti houbovým chorobám

<b>Balení:</b>	5l HDPE kanystr
<b>Registrační číslo:</b>	přípravek je v registračním řízení
<b>Doba použitelnosti:</b>	při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C
<b>Formulace:</b>	emulgovatelný koncentrát

### PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Difo je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Účinná látka přípravku patří do chemické skupiny DMI triazolů (působí jako demetylační inhibitor).

### REGISTROVANÉ APLIKACE

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka l/ha	OL (dny)	Poznámka
Řepka olejka	fómová hniloba brukvovitých, čern řepková, hlízka obecná	0,25 l/ha na podzim, 0,5 l/ha na jaře	AT	do 69 BBCH

### APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Plodina	Dávka vody l/ha	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Řepka olejka	200–400	postřik	2x do celkové dávky 1,0 l/ha	14 dní

### UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení e možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Přípravek dosahuje v řepce olejce průměrné účinnosti.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

## MÍSITELNOST

Fungicid Difo je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy a listovými hnojivý.

## OMEZUJÍCÍ ÚDAJE

Riziko pro vodní organismy	SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
	SPe3	Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – Strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č. 2
	DO	S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Riziko pro ostatní necílové členovce	SPe3	Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m] – Strukturovaná data v tabulce č. 3

### Tabulka č. 2:

#### Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Řepka olejka	4	4	4	4

### Tabulka č. 3:

#### Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

Plodiny	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Řepka olejka	5	5	5	5