

BARCA 334 SL

Účinné látky: 267 g/l klopyralid, 67 g/l pikloram

HERBICIDY

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky proti dvouděložným plevelům.

Balení: 5 l kanystř HDPE
Registrační číslo: 5602-0
Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
Formulace: rozpustný koncentrát

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Přípravek Barca 334 SL působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3–4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. Prvé symptomy poškození jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3–6 dní po aplikaci.

Obě účinné látky mají podobný způsob pohybu v rostlině a účinku – jsou absorbovány listy a stonky. Následně jsou translokovány akropetálně i bazipetálně.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Jarní aplikace – dávka 0,25 l/ha

Citlivé plevele: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní.

Méně citlivé plevele: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná.

– dávka 0,35 l/ha

Citlivé plevele: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední.

Méně citlivé plevele: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní.

Podzimní aplikace – dávka 0,2 l/ha

Citlivé plevele: merlík bílý, rmen rolní listů, pcháč oset – přizemní růžice až 10 cm výšky.

REGISTROVANÁ APLIKACE

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka l/ha	Poznámka
řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní	plevele dvouděložné	0,25–0,35	od 19 BBCH do 31 BBCH, na jaře
řepka olejka ozimá	plevele dvouděložné	0,2	od 13 BBCH do 15 BBCH, na podzim

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Plodina	Dávka vody l/ha	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka ozimá	200–300	postřik	1x
řepka olejka jarní	200–300	postřik	1x

Aplikujte v rozmezí teplot 8 °C až +25 °C.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setím. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty) Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

MÍSITELNOST

Herbicide Barca 334 SL je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy, herbicidy a listovými hnojivy.

OMEZUJÍCÍ ÚDAJE

Riziko pro vodní organismy	SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
	SPe3	Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] - Strukturovaná data v tabulce č. 2
Ochranná pásma vod	OP II. st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Tabulka č. 2:

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Plodiny	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
řepka olejka	5	5	5	0