

METAFOL SUPER®

Účinné látky: 150 g/l ethofumesát, 350 g/l metamitron

HERBICIDY

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v krmné řepě a cukrové řepě.

Balení: 5 l kanystr HDPE
Registrační číslo: 5678-0
Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
Formulace: suspenzní koncentrát

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Přípravek Metafol Super je selektivní herbicid s kontaktním i dlouhodobým reziduálním působením. Účinná látka metamitron patří chemicky do skupiny triazinů, je přijímána listy i kořeny plevelných rostlin. Nejvyšší účinnost je dosahována od fáze klíčení plevelů až do vyvinutého 1. páru pravých listů. Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí.

Účinná látka ethofumesát patří chemicky do skupiny benzofuranů, je přijímána listy i kořeny vzešlých plevelů a inhibuje buněčné dělení. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vlhkost podporují účinnost přípravku. Účinek přípravku se projeví za 4–8 dní podle povětrnostních podmínek.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Citlivé plevele: ptačinec prostřední, konopice polní, merlík, violka rolní, penízek rolní, hluchavka nachová, rdesno červivec, kokoška pastuší, tobolka, lipnice roční, laskavec ohnutý, různé druhy heřmánku, svízel přítula

Méně citlivé plevele: pohanka obecná, rdesno ptačí

REGISTROVANÁ APLIKACE

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka l/ha	OL (dny)	Poznámka
cukrovka, řepa krmná	plevele dvouděložné jednoleté	2,0	5	od BBCH 00 do BBCH 09
cukrovka, řepa krmná	plevele dvouděložné jednoleté	2,0	5	od BBCH 10 do BBCH 19

Přípravek se aplikuje v následných postřicích vždy na novou vlnu plevelů. Maximální celková dávka přípravku v plodině je 6 l/ha tj. 1. aplikace preemergentně + 2. a 3. aplikace postemergentně nebo 1. až 3. aplikace pouze postemergentně.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Plodina	Dávka vody l/ha	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná	200–400	postřik	3x	5 dnů

Nejvyšší účinnost je dosahována v době aktivního růstu plevelů od fáze klíčení až do vyvinutého 1. páru pravých listů (BBCH 10-11).

Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek aplikujte při teplotě do 21 °C!

Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících dnů očekávány mrazíky.

MÍSITELNOST

Herbicid Metafol Super je mísitelný s registrovanými herbicidy (zejména na bázi DMP a PMP) a listovými hnojivy.

OMEZUJÍCÍ ÚDAJE

Riziko pro vodní organismy	SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
	SPe3	Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – Strukturovaná data v tabulce č. 2
Riziko pro životní prostředí	SPe1	Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.
Ochranná pásma vod	OP II.st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Tabulka č. 2:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
cukrovka, řepa krmná	4	4	4	4