

WUXAL® SULFUR

Složení:

198 g/l N (121 g/l v amidické formě a 77 g/l v amoniakální formě),
693 g/l SO₃ a plně chelatitované stopové prvky B, Cu, Fe, Mo, Mn, Zn
v množství odpovídajícím fyziologickým potřebám rostlin

Wuxal Sulfur má kromě obsahu dusíku a stopových mikroživin i velmi vysoký obsah síry. Toto složení živin je obzvláště důležité pro syntézu proteinů, neboť síra i dusík jsou obsaženy v aminokyselinách, jako je methionin a cystein. Síra a dusík jsou známé svým synergickým účinkem na metabolismus rostlin. Síra je také zapojena v odolnosti rostlin vůči chorobám. Všechny kationtové stopové prvky jsou plně a silně chelátované, a proto dobře dostupné pro příjem listy a transport uvnitř rostliny

Balení: 20l

DOPORUČENÍ K APLIKACI

Plodina	Dávka	Poznámka
Obilniny (pšenice ozimá, ječmen ozimý)	3–5 l/ha 1–2x	1. odnožování 2. začátek prodlužovacího růstu až do prvního kolínka
Kukuřice	5 l/ha 1–2x	1. 4–6 pravých listů 2. 10 pravých listů
Řepka olejka	3–5 l/ha 1–2x	1. v průběhu vývoje listové plochy (podzimní aplikace stádium 4–6 listů pro ozimou řepku olejnou) 2. na začátku prodlužovacího růstu
Cukrovka	3–5 l/ha 1–2x	1. 4–6 pravých listů 2. 6–8 pravých listů
Košťálová zelenina	3–5 l/ha 1–2x	1. 4–6 pravých listů 2. 10 pravých listů
Cibule, česnek	3–5 l/ha 1–2x	1. 5 nebo několik listů viditelných 2. začátek tvorby cibule
Špenát	5 l/ha 1–2x	1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 2. dva týdny před sklizní
Salát	3–5 l/ha 1–2x	1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 2. dva týdny před sklizní

Při aplikaci na řepku olejku a košťálovou zeleninu doporučujeme aplikovat tank-mix hnojiva Wuxal Sulfur se 3–5 l/ha hnojiva Wuxal Oilseed. Pro aplikaci doporučujeme použít dostatečné množství vody 400 l/ha.

Nedoporučujeme aplikovat v průběhu kvetení nebo zrání.

MÍSITELNOST

I když Wuxal Sulfur je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, doporučujeme provést test mísitelnosti, zvláště když směs připravujete poprvé.

HNOJIVA

WUXAL SULFUR