

Eutrofit je kapalný pomocný rostlinný přípravek, obsahující nízkomolekulární látky příznivě působící na tvorbu chlorofylu a tím stimuluji fotosyntézu v listech rostlin. Je to látka organického původu vyrobená z krve pocházející z jatek a je tepelně upravená v souladu s Nařízením EU č. 1774/2002 a 181/2006

Balení: 20l (25kg)

DOPORUČENÍ K APLIKACI

Eutrofit může být přednostně používán spolu s pesticidy v dávce 400–500 gramů produktu (tj. 0,4–0,5 litru) na každých 100 litrů vody. Poslední ošetření musí být vždy provedeno před květem vyznačuje se dobrou kompatibilitou s měďnatými přípravky. Chovným zvířatům nesmí být umožněn vstup na ošetřený pozemek dřívě, než po uplynutí 21 dní po aplikaci.

Nepoužívat ve směsi s přípravky na ochranu rostlin s kyselou reakcí a s minerálními oleji.

DOPORUČENÍ K APLIKACI

| Plodina | Dávkování na ha | Poznámka |
|------------------------------|-------------------|---|
| Réva | 25–30 kg (22–27l) | přibližně 5 ošetření, poslední ošetření nejpozději před květem |
| Sója | 10–15 kg (9–13l) | při výšce porostu 15 cm |
| Cukrová řepa | 25–30 kg (22–27l) | rozdělit na 3 ošetření po 8–10 kg/ha (tj. 7–9l) co nejdříve jak je to je možné, nejpozději začátkem srpna |
| Pšenice, ječmen, oves | 7–8 kg (6–7l) | v době metání |
| Kukuřice | 10 kg (tj. 9l) | při výšce rostlin 50 cm /další 3 kg (tj 3 litry) při aplikaci herbicidů/, nejpozději do konce června |
| Řepka olejka | 7–10 kg (6–9l) | před kvetením |
| Slunečnice | 10 kg (9l) | před otevřením květenství |
| Bob na zrno | 10 kg (9l) | jednou před kvetením |
| Fazol na zrno, hrách na zrno | 7 kg (6l) | jednou před kvetením |
| Brambor | 25–30 kg (23–27l) | rozdělit na 3–4 ošetření spolu s aplikací měďnatých přípravků |
| Chmel | 25–30 kg (23–27l) | celkem 2 ošetření před kvetením |
| Cibule – semenné porosty | 25 kg (23l) | před kvetením, rozdělit na 3–4 aplikace |

V poloprovozních pokusech se zjistilo, že pozemkům ošetřeným hnojivem Eutrofit se vyhýbá divoká zvěř (srnec, prase divoké, zajíc).