

Regulátor růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentráту pro redukci nadměrné násady plodů u jableň a hrušň.

Balení: 5l kanystř HDPE
Registrační číslo: 5139-0
Doba použitelnosti: při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30°C.
Formulace: rozpustný koncentrát

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Exilis je regulátor růstu a vývoje sloužící k redukci násady plodů po odkvětu u jableň a hrušň s nadměrným počtem květů nebo u stromů, kde nedochází k dostatečnému opadu plodů po květu. Účinnost přípravku je ovlivněna několika faktory včetně vitality stromu, intenzity kvetení, opylení a klimatických podmínek. Vyšší účinnosti bývá dosaženo při vyšších teplotách v době aplikace a v období po aplikaci. Proto je doporučeno aplikovat přípravek v době aktivního růstu stromu, při teplotách nad 15°C i během několika dnů (3 až 5 dnů) následujících po aplikaci. Zvýšená relativní vzdušná vlhkost zajistí lepší penetraci přípravku, a tím i zvýšení účinku, který je patrný během 2 až 3 týdnů po aplikaci. Vysoká teplota (nad 28°C) v době aplikace a několik dní po ní však může způsobit až nadměrný opad plodů.

REGISTROVANÁ APLIKACE

Plodina	Úškovlivý organizmus	Dávka l/ha	OL (dny)	Poznámka
jabloň	redukce nadměrné násady plodů	3,75–7,5	90	od 71 BBA do 74 BBA velikost plodů 7–15 mm
hrušň	redukce nadměrné násady plodů	5,0–7,5	90	od 71 BBA do 74 BBA velikost plodů 7–15 mm

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Plodina	Dávka vody l/ha	Způsob aplikace	Maximální počet aplikací v plodině
jabloň, hrušň	max. 1 000	postřik, rosení	1x

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

Maximální koncentrace postřikové kapaliny nesmí překročit 750 ml přípravku ve 100l vody. Dávkování volíme podle velikosti koruny a hustoty olistění. Aplikace musí být provedena v období aktivního růstu stromů, při denní teplotě nejméně 15°C. Tato teplota by měla přetrvávat i ve dnech následujících po aplikaci. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

Minimální teplota by měla být 18 °C (optimální pak 22–25 °C), důležitá je i stálost teploty několik dní po aplikaci.

Velikost plůdků a počasí jsou stěžejní pro účinnost přípravku (ø plůdků 12 mm, u Jonagoldu 18 mm).

Dávka pro odrůdy Boskoop, Breaburn, Bramley, Cox, Idared, Granny Smith, Jazz, Jonagold a Kanzi je 5,0–7,5 l/ha

Dávka pro odrůdy Delbarestival, Discovery, Elstar, Gala, Gloster, Golden Delicious, Pinova a Rubens je 7,5 l/ha.

U odrůdy Red Delicious není doporučeno používat samostatně.

Lze mísit s 10% NAA, zvláště pokud jsou teploty do 20 °C (nikdy nepřidávat do aplikací v odrůdě Idared).

MÍSELNOST

Regulátor růstu Exilis je mísitelný s kyselinou α -naftyl octovou (NAA).

OMEZUJÍCÍ ÚDAJE

Riziko pro vodní organismy	SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
----------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
