

MELIGET®

Účinná látka: 300 g/kg indoxakarb

Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně řepky proti blýskáčku řepkovému a révy proti obaleči mramorovanému

Balení:	HDPE/EVOH láhev se šroubovacím uzávěrem a přípravkem v množství 30 g, 60 g, 150 g, 250 g, 1 kg.
Registrační číslo:	5594-2
Doba použitelnosti:	při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C.
Formulace:	ve vodě dispergovatelné granule

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce a révě. Obsahuje indoxakarb, účinnou látku patřící do skupiny oxadiazinů. Působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy.

REGISTROVANÉ APLIKACE

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka kg/ha	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,085	56	od 51 BBCH, do 59 BBCH
réva	obaleč mramorovaný	0,1	10	od 53 BBCH, do 61 BBCH

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Plodina	Dávka vody l/ha	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
řepka olejka	400–800	postřik	1x	
réva	400–800	postřik, rosení	2x za rok	10-14 dnů

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku indoxakarb, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Vstup na ošetřené pole s řepkou je možný až druhý den po aplikaci.

Vstup na ošetřené vinice je možný až za 10 dnů po poslední aplikaci a následnými OOPP – ochranný oděv a rukavice.

MÍŠITELNOST

Insekticid Meliget je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

OMEZUJÍCÍ ÚDAJE

Riziko pro vodní organismy	SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
	SPe3	Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č. 2
Bezpečnostní opatření	DO	Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro ostatní necílové členovce	SPe3	Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m] – Strukturovaná data v tabulce č.3

Tabulka č. 2:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny	Bez redukce [m]	Tryska 50 % [m]	Tryska 75% [m]	Tryska 90% [m]
Réva	6	6	6	6

Tabulka č. 3:

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

Plodiny	Bez redukce [m]	Tryska 50 % [m]	Tryska 75% [m]	Tryska 90% [m]
Réva	5	0	0	0