



Listová hnojiva

WUXAL®

**... skvělý nástroj,
který vždy zkvalitní
Vaši úrodu!**

Wuxal® Amino

Wuxal® Aminocal

Wuxal® Boron Plus

Wuxal® Microplant

Wuxal® Oilseed

Wuxal® Sulphur

Wuxal® Super

Wuxal® SUS Kalcium

Wuxal® SUS Kombi Mg

Wuxal® Top P

Bezpečně ♦ Kvalitně ♦ Výkonně

Součástí moderních pěstitelských technologií je mimo jiné i listová výživa. Stává se tak důležitou a často zcela nezbytnou aplikací, přispívající k dosažení jednak špičkových výnosů, ale zejména vysoké kvality finální zemědělské produkce. Listová hnojiva řady Wuxal mají řadu praktických výhod a předností, mezi které patří:

◆ **Všechny stopové prvky jsou vázány v chelátové formě**

V hnojivech Wuxal je obsaženo jedno z neúčinnějších chelatizačních činidel – kyselina ethylendiaminotetraoctová (EDTA), která váže kationty stopových prvků do chelátů. Tato vazba chrání stopové prvky před nežádoucími chemickými vazbami v roztoku (nedochází k jejich blokování) avšak rostlinami jsou v této podobě velice snadno přijímány.

◆ **V hnojivech je obsažen nadbytek chelatizačního činidla**

Tento nadbytek činidla má dva účely. Za prvé se snižuje tvrdost vody určené pro aplikaci, neboť ve vodě se vyskytující vápník či železo se vážou rovněž do chelátových vazeb a jsou tak přístupné pro rostliny jako živiny. Za druhé slouží k neutralizaci postřikové jichy. Tato tzv. pufovací schopnost stabilizuje hodnotu pH postřikové jichy bez ohledu na pH použité vody. Výsledkem je zajištění optimálního pH postřikové kapaliny a naprosto bezproblémová mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin a zároveň tím i bezpečnost pro ošetřované plodiny.

◆ **Moderní formulace**

Hnojiva Wuxal Microplant, Wuxal Boron Plus, Wuxal SUS Kalcium a Wuxal SUS Kombi Mg jsou ve formě suspenzního koncentrátu. Běžně používaná tekutá hnojiva obsahují takové množství prvků, které je dáno jejich fyzikální rozpustností ve vodě. Oproti tomu jsou suspenzní hnojiva řady Wuxal SUS schopna pojmout výrazně větší množství živin. S obsahem vody pouze 15 %, která slouží jako rozpouštědlo, a vše ostatní jsou živiny, umožňují tato vysoce koncentrovaná hnojiva jednoduchou manipulaci, šetří náklady na přepravu a rovněž se velice snadno dávkují. Po přidání do postřikové jichy se díky velmi rychlé rozpustnosti homogenně rozmísí do celého objemu nádrže postřikovače.

◆ **V hnojivech jsou obsaženy speciální adjuvanty**

Tyto látky výrazně zlepšují přilnavost postřikové jichy k povrchu listů, současně se tím zvyšuje i rovnoměrnost pokrytí listové plochy. Dále je postřiková vrstvička chráněna proti smyvu deštěm a nadměrně rychlému odpaření. I po zaschnutí postřiku na listech umožňují tato aditiva čerpání živin z tenké vrstvičky filmu, čímž se prodlužuje doba po kterou jsou živiny pro rostliny přístupné a tak se zvyšuje efektivita využití těchto listových hnojiv.

◆ **Při výrobě hnojiv jsou použity pouze nejkvalitnější suroviny**

Listová hnojiva řady Wuxal obsahují nepatrná množství balastních látek a nežádoucích prvků (např. chlórů). Proto jsou lehce rostlinami přijímána a současně jsou velice bezpečná pro ošetřované plodiny.

Složení vybraných listových hnojiv Wuxal (obsah je uvedený v g.l⁻¹)

Obsah g.l ⁻¹	Wuxal [®] Amino	Wuxal [®] Aminocal	Wuxal [®] Boron Plus	Wuxal [®] Microplant	Wuxal [®] Oilseed	Wuxal [®] Super	Wuxal [®] Sulfur	Wuxal [®] SUS Kalcium	Wuxal [®] SUS Kombi Mg	Wuxal [®] Top P
N	113	-	70	75	-	99,2	199	160	300	63,8
P₂O₅	-	-	183	-	-	99,2	-	-	-	255
K₂O	volné	-	-	150	-	74,4	-	-	225	63,8
MgO	aminokys.	-	-	45	-	-	-	30	60	-
B	-	-	108	4,5	84	0,124	0,133	0,8	0,3	0,128
CaO	-	202	-	-	-	-	-	240	-	-
SO₃	-	-	-	78	-	-	696	-	-	-
Fe	-	-	1,4	15	-	0,248	0,265	0,8	1,5	0,255
Cu	-	-	0,7	7,5	-	0,049	0,053	0,64	0,75	0,051
Mn	-	6,8	0,7	22,5	70	0,148	0,159	1,6	0,75	0,153
Mo	-	-	0,014	0,15	3,5	0,012	0,013	0,016	0,015	0,013
Zn	-	6,8	0,7	15	-	0,049	0,053	0,32	0,75	0,051



Wuxal® Amino je nově vyvinutý kapalný organický stimulant pro rychlou revitalizaci stresovaných rostlin. Obsahuje organický dusík získaný z přírodních peptidů a volných aminokyselin, dále aminokyseliny (766 g/l), zejména prolin, alanin, glycin, treonin a další) a polypeptidy. Díky přilnavosti a také smáčecí schopnosti je Wuxal® Amino schopný stabilizovat nebo dokonce zvyšovat účinnost pesticidů. Wuxal® Amino má být používán v první řadě pro listovou aplikaci, ale také pro kapkovou závlahu. Je vyrobený z vedlejších produktů živočišného původu (materiál 3. Kategorie) technologií podle nařízení (ES) č. 1069/2009.

Mísitelnost:

I když Wuxal® Amino je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, doporučujeme provést test míšitelnosti, zvláště když směs připravujete poprvé. Nemíchejte s přípravky obsahujícími měď.

Upozornění:


Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 20 l

Wuxal® Amino je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Při použití v ekologickém zemědělství nepoužívejte na jedlé části plodin.

plodina	dávka	poznámka
Jádroviny	2 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 5 l/ha	3 aplikace - v stadiu zeleného poupěte. - květy v stadiu „balónu“ před kvetením - začátek kvetení 1 aplikace po sklizni
Peckoviny	3–5 l/ha 5 l/ha	3 aplikace - před kvetením - po opadu květných lupenů
Třešně	3 l/ha 3 l/ha	4 aplikace - plody se zbarvují do žluta - plody se zbarvují do červena
Švestky	5–10 l/ha (1%)	4 aplikace v době ošetření proti šarce švestek (plum pox virus) v době opadu květných lupenů a v 30 denních intervalech.
Jahody	3 l/ha	4 aplikace po výsadbě v aplikaci spolu s pesticidy proti šedé hnilobě
Zelenina	3–5 l/ha	3–4 aplikace 2–3 týdny po výsadbě nebo po vzejití resp. opakovat v 14 denních intervalech
Réva	3–5 l/ha	3–4 aplikace před a po kvetení
Školky	250–300 ml /100 l vody	aplikovat podle aktuální potřeby v době rozmnožování řízkováním
Skleníky/ fóliovníky	200–250 ml /100 l vody	3–5 aplikací v stadiích nízkých nároků na výživu
Cukrová řepa	2–3 l/ha	3 aplikace v ošetření spolu s postemergentními herbicidy
Brambory	2–3 l/ha	3 aplikace v ošetření spolu s postemergentními herbicidy
Obilniny	2–3 l/ha	2–3 aplikace v ošetření spolu s fungicidy

Použití Wuxalu® Amino



Vinná réva



Cibule



Jabloň



Vysoce koncentrované listové hnojivo obsahující vápník pro předsklizňové použití v ovocných dřevinách, jahodách, zelenině a révě vinné. Vyvážená výživa rostlin vápníkem předchází rozvoji chorob z nedostatku vápníku (skládkové choroby). Wuxal® Aminocal je speciální roztokové hnojivo s vysokým obsahem vápníku, obsahující stopové prvky Mn a Zn a dále adhezni činidlo. Wuxal® Aminocal je určen jak pro preventivní použití, tak i k odstranění akutního nedostatku vápníku. Vzhledem ke speciální formulaci je vápník rychle přijímán listy a slupkou plodů.

Misitelnost:

Wuxal® Aminocal je misitelný s běžně používanými pesticidními přípravky. V každém případě však doporučujeme provést předem před prvním použitím pro zvýšení jistoty test na misitelnost. Wuxal® Aminocal není misitelný s Wuxalem SUS Kombi Mg a Wuxalem Boron Plus. Wuxal® Aminocal dále nelze mísit s látkami vykazujícími alkalickou reakci!

Upozornění:


Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Při potřebě ošetření jaderovin proti nedostatku vápníku počátkem vegetace doporučujeme používat spíše Wuxal® SUS Kalcium, který je lépe snášen, než Wuxal® Aminocal.

Balení: 20 l

Wuxal® Aminocal je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

plodina	dávkování, aplikační poznámky
Jabloně, hrušně	Předcházení chorobám z nedostatku vápníku se aplikuje 3–4x od počátku srpna, resp. 3–5 týdnů před sklizní v dávce 5–10 l/ha (min. 600 l vody) v intervalech minimálně 8 dní – s ohledem na citlivost odrůdy (velmi náchylné odrůdy jsou např. Cox Orange, Boskoop, Gravenstein, James Grieve apod.), násadu a velikost plodů. Velmi důležité je zejména poslední ošetření cca. 14 dní před sklizní. Přípravek současně podporuje vybarvení plodů.
Třešně, višně	Proti nedostatku vápníku se aplikuje 2–3x v dávce 5 l/ha po cca. 10 dnech počínaje v době 6–8 týdnů před sklizní. K prevenci a snadnějšímu překonání stresových stavů se aplikuje 2–3x během daného období v dávce 5 l/ha.
Švestky	Proti nedostatku vápníku se aplikuje nejlépe 4x, poprvé ihned po odkvětu a dále po 30, 60 a 90 dnech v dávce 5 l/ha.
Réva vinná	Přípravek zpevňuje rostlinná pletiva a omezuje předčasně ochrnutí stopek hroznů. Aplikuje se po odkvětu současně s běžně používanými pesticidy. Proti předčasnému ochrnutí stopek se ošetřuje těsně před nebo na počátku zaměkání. Ošetření 2–3x opakovat v intervalu 7–10 dní. Ukončit cca. 14 dní před sklizní. Dávka 5 l/ha.
Zelenina (zejména rajčata, paprika, okurky, salát, brukvovité aj.)	Hnojivo se aplikuje podle potřeby s ohledem na požadavky plodiny. U polních zelenin v dávce 5 l/ha, pod fólií či sklem se použije dávky 200–250 ml/100 l vody. <u>K rajčatům a paprikám</u> se aplikuje podle potřeby v 7–10 denních intervalech, poprvé 10 dní po nasazení plodů až do doby těsně před sklizní. <u>Okurky</u> : poprvé krátce po nasazení plodů, opakovat po 14 dnech, naposledy 2 týdny před poslední sklizní. <u>Salát, čínské zelí, květák</u> : poprvé krátce po počátku tvoření hlávky, opakovat 1x týdně. <u>Endivie</u> : jedna aplikace 10–14 týdnů po výsadbě. <u>Celer, čekanka, růžičková kapusta</u> : jedna aplikace 5–7 týdnů před sklizní, postřik musí zasáhnout „srdéčko“.

Příznaky nedostatku vápníku



Jabloň (příznaky na listech)



Okurka



Jabloň (příznaky na plodech)



Wuxal® Boron Plus je vysoce koncentrované borové hnojivo obsahující plně chelatizované stopové živiny pro plodiny s vysokým nárokem na obsah boru jako je cukrovka, řepka olejka, ovoce a zelenina. Wuxal® Boron Plus má stimulační účinek na rostliny které jsou ve fyziologickém stresu v časných fázích růstu a je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin. Výsledkem je vyšší výnos a vyšší kvalita úrody. Wuxal® Boron Plus vyrovnává pH aplikační kapaliny na úroveň, která je pro rostliny fyziologicky dobře přijatelná. Wuxal® Boron Plus obsahuje speciální aditiva, která zaručují dobrou odolnost vůči dešti a vynikající přilnavost i za nepříznivých klimatických podmínek. Aby se dosáhlo zlepšení účinku aplikovaného hnojiva, aplikovat třeba brzy ráno, skoro večer nebo za oblačného počasí.

Mísitelnost:

I když je Wuxal® Boron Plus kompatibilní s nejběžněji používanými přípravky na ochranu rostlin, doporučujeme při prvním použití otestovat kompatibilitu směsi.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 10l

plodina	dávka	poznámky
Cukrová řepa – pro vyšší úrody cukru a na podporu odolnosti proti suché hniloba a hnilobě srdíčka řepy	1–2 l/ha	2 aplikace – ve fázi 4–6 listů – krátce před zapojením porostu
Řepka olejka – pro vyšší úrodu oleje a na podporu dobrého vývinu šesňů a semen	1–2 l/ha	2 aplikace – prodlužovací růst – ve stadiu butonizace až do začátku kvetení
Kukuřice – pro zvýšení výnosu i kvality úrody kukuřice	1–2 l/ha	1–2 aplikace – na začátku růstu, ve stádiu 4–5 listů – na začátku prodlužovacího růstu, v stadiu 7–9 listů
Slunečnice – pro zvýšení výnosu	1 l/ha	1–2 aplikace – před květem
Jádroviny – podpora kvetení a zvýšení jemnosti slupky plodů	1 l/ha	3 aplikace – kvetení – stadium růstu – po sklizni
Peckoviny – pro lepší nasazení květů a podporu kvetení	1–2 l/ha	2 aplikace – začátek plného květu – po sklizni
Réva vinná – proti opadu květů a mladých plodů	1–2 l/ha	2 aplikace – před květem – na konci kvetení
Zelenina (Zelí, mrkev, celer, fazole, hrách, ředkvička, salát hlávkový) zvýšení kvality	1–2 l/ha	2–3 aplikace – obecně 2–3 týdny po přesazení – opakovat v 8–10 denních intervalech – zelí: ve stádiu 4–6 listů, na počátku tvorby hlávky

Příznaky nedostatku vápníku



Vinná réva



Kukuřice



Cukrová řepa



Hruška



Speciální hnojivo s vysokým obsahem mikroprvků určené pro cílenou výživu prostřednictvím listů u velmi intenzivně pěstovaných plodin. Všechny živiny jsou pro rostliny okamžitě přístupné. Proto je toto hnojivo vhodné jak pro odstranění akutního nedostatku živin, tak i pro preventivní použití. Množství živin v něm obsažených odpovídá fyziologickým potřebám intenzivně pěstovaných rostlin.

Mísitelnost:

Wuxal® Microplant je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti před začátkem aplikace.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 10l

plodina	dávkování, aplikační poznámka
Mák	1–2x V období před květem Dávka 1–2 l/ha
Obilniny	1–2x 1. fáze sloupkování 2. objevení se klasu Dávka 0,5–2 l/ha
Řepka olejka	1–2x V období před květem Dávka 1–2 l/ha
Cukrová řepa	2x Ve fázi od 4 listů do zakrytí řádků Dávka 1–2 l/ha
Brambory	1–2x V období po odkvětu Dávka 1 l/ha
Kukuřice	1–2x Ve fázi 2–6 listů Dávka 1 l/ha
Ovocné stromy ¹⁾	2–3x* v období sucha na začátku léta, dávka 1 l/ha
	4–5x* uprostřed léta, dávka 1 l/ha
	2–3x* po sklizni, dávka 0,5 l/ha
Réva vinná	2–3x V období od tvorby bobulí do fáze zaměkání bobulí Dávka 1 l/ha
Zelenina	3–4x* v období intenzivního růstu, dávka 2 l/ha
Lesní školky	1–2x podle výživného stavu, dávka 1 l/ha

1) u švestek a slivoní je vhodné provést před aplikací zkoušku na citlivost některých odrůd

* mezi jednotlivými aplikacemi by měl být interval minimálně 8–10 dní

Příznaky nedostatku některých živin



Nedostatek draslíku (kukuřice)



Nedostatek zinku (kukuřice)



Nedostatek draslíku (sója)



Nedostatek manganu (pšenice)



Nedostatek manganu (vinná réva)



Směs stopových živin ve formě suspenze pro listovou výživu borem, manganem a molybdenem. Složení Wuxalu Oilseed, zejména poměr jeho živin, vyhovuje specifickým požadavkům řepky olejky a slunečnice. B, Mn nebo Mo se stávají nevyužitelné z půdy zejména z důvodů vlivu těchto podmínek: chladné a vlhké půdy, nevhodná hodnota půdního pH, silné dešťové srážky, které způsobují vyplavení, slabě vyvinuté kořeny a suché podmínky. Aplikace těchto stopových živin na podzim v porostech podpoří růst a přezimování nebo na jaře podpoří nárůst úrody a obsahu oleje v semenech.

Mísitelnost:

Wuxal® Oilseed je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Doporučuje se zejména ve společné aplikaci se sirnatými hnojivy, pokud má řepka olejka vyšší požadavky na síru. I když je Wuxal® Oilseed kompatibilní s množstvím, běžně používaných přípravků na ochranu rostlin, doporučujeme provést test mísitelnosti zejména při prvním použití v dané směsi.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 10l

Wuxal® Oilseed je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

plodina	dávka	poznámka
Řepka olejka	2,0 l/ha 1–3x	1. V průběhu vývoje listů (podzimní aplikace, stadium 4–6 listů v řepce olejné ozimé). 2. Na začátku stadia prodlužovacího růstu stonku. 3. Od objevení se prvního květu do začátku kvetení. Aby se dosáhlo optimálního ovhlčení listů, při poslední aplikaci v stadiu kvetení je třeba aplikovat dostatečné množství vody přibližně 400 l/ha ve směsi s fungicidy.
Slunečnice	2,0 l/ha 1–2x	1. Ve stadiu tvorby listů. 2. Na začátku prodlužovacího růstu.

Příznaky nedostatku některých živin



Nedostatek bóru (řepka)



Nedostatek molybdénu (karfiol)



Nedostatek bóru (slunečnice)



Kromě obsahu dusíku a stopových mikroživin má i velmi vysoký obsah síry. Toto složení živin je obzvláště důležité pro syntézu proteinů, neboť síra i dusík jsou obsaženy v aminokyselinách, jako je methionin a cystein. Síra a dusík jsou známy svým synergickým účinkem na metabolismus rostlin. Síra je také zapojena v odolnosti rostlin vůči chorobám. Všechny kationtové stopové prvky jsou plně a silně chelátované, a proto dobře dostupné pro příjem listy a transport uvnitř rostliny.

Mísitelnost:

Wuxal® Sulfur je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Pro postřik doporučujeme použít dostatečné množství vody 400l/ha.

I když je Wuxal® Sulfur kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, při prvním použití hnojiva doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 20l

Dávkování a podmínky používání:

Nejllepší účinku je dosaženo, když je Wuxal® Sulfur aplikován brzy ráno nebo v podvečer, nebo když je zataženo.

plodina	dávka	poznámka
Obilniny (pšenice ozimá, ječmen ozimý)	3–5 l/ha 1–2x	1. odnožování 2. začátek prodlužovacího růstu až do
Kukuřice	5 l/ha 1–2x	1. 4–6 pravých listů 2. 10 pravých listů
Řepka olejka	3–5 l/ha 1–2x	1. v průběhu vývoje listové plochy (podzimní aplikace stádium 4–6 listů pro ozimou řepku olejnou) 2. na začátku prodlužovacího růstu
Cukrovka	3–5 l/ha 1–2x	1. 4–6 pravých listů 2. 6–8 pravých listů
Košťálová zelenina	3–5 l/ha 1–2x	1. 4–6 pravých listů 2. 10 pravých listů
Cibule, česnek	3–5 l/ha 1–2x	1. 5 nebo několik listů viditelných 2. začátek tvorby cibule
Špenát	5 l/ha 1–2x	1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 2. dva týdny před sklizní
Salát	3–5 l/ha 1–2x	1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 2. dva týdny před sklizní

Při aplikaci na řepku olejku a košťálovou zeleninu doporučujeme aplikovat směs hnojiva Wuxal Sulfur s 3–5 l/ha hnojiva Wuxal Oilseed.

Nedoporučujeme aplikovat v průběhu kvetení nebo zrání.

Příznaky nedostatku síry



Řepka



Řepka



Pšenice



Kapaln  hnojivo s n zk m obsahem chloru pro pou it  v poln ch plodin ch, zelin rstv , okrasn ch rostlin ch, ovocn ch d evin ch, vinn  r v  a ve  kolk ch. Pou iv  se pro aplikaci jak na list, tak p ipadn  do p dy (zejm na v zahradnictv ). Cu, Fe, Mn a Zn jsou v chel tov  vazb  a jsou proto rostlinami snadno p ijim ny.

Misitelnost:

Hnojivo je fyzik ln  a chemicky misiteln  s fungicidy i insekticidy, b   n  se nach zejicimi na trhu, mo nosti m ch n  je nutno konzultovat s v robci pesticid . Nedoporu ujeme jej pou ivat ve sm si se siln  alkalick mi post rky typu Bordeauxsk  nebo sirov penat  j chy a s polysulfidy. P ed prvn m provozn m o et ren m okrasn ch rostlin sm si Wuxal  s pesticidy doporu ujeme ov řit citlivost kultury k t to sm si v dan ch m stn ch podm nk ch.

P i p iprav  sm si s pesticidy se do n dr e v dy vprav  jako prvn  Wuxal  Super a teprve pot  se p edepsan m postupem d vkuje p slu n y pesticid. Wuxal  Super nedoporu ujeme m sit s ho kou sol , Wuxalem Amino, Wuxalem Aminocal, Wuxalem SUS Kalcium, Wuxalem SUS Kombi Mg a Wuxalem Microplant.

Upozorn ni:

Pou ivat pouze v p ipad  skute n  pot eby. Nep ekracovat doporu en  d vkov n .

Balen : 20l, 200l

plodina	d�vkov�n�, aplika�n� pozn�mka
Poln� plodiny (obilniny, ř�pka ozim�, kukuřice, brambory, cukrov� ř�pa)	hnojivo lze pou�it� sou�asn� s b���n�mi pesticidy v d�vce 3–5 l/ha ve 14 denn�ch intervalech
Poln� zelenina – okurky, raj�ata, paprika	d�vka 5l/ha, o�et�ren� 2x p�ed kv�tem a d�le 3–4x v intervalech 14 dn�
Brukvovit� zelenina, sal�t	o�et�ren� 4x, poprv� po v�sadb�, pot� v cca. 10 denn�ch intervalech, koncentrace 0,1–0,2 %.
Mrkev	6 o�et�ren� v dvout�denn�ch intervalech, d�vka 5 l/ha
Melouny, cibule	o�et�ruje se 4x, poprv� m�s�c po vzejit�, d�le ve dvout�denn�ch intervalech, d�vka 5 l/ha
Jahody	o�et�ren� 1x t�denn�, koncentrace 0,1–0,2 %.
R�va vinn�, ovocn� d�viny	lze pou�it� sou�asn� s o�et�ren�m b���n�mi pesticidy, koncentrace 0,3 %.
�kolky ovocn�ch a okrasn�ch d�evin	v nejmlad�ch r�stov�ch stadi�ch (po vytvo�en� prv�ch list�) post�řik nebo z�livky o konc. 0,1 %, pozd��ji 0,2 %. P�i z�livce zaml�zov�n�m lze poka��d� Wuxal Super p�ridat v koncentraci 0,05 %. V pozd��j�ch v�vojov�ch stadi�ch lze Wuxal Super pou�ivat v koncentraci 0,2 % i p�i aplikac�ch v�ech b���n� pou�ivan�ch pesticid�.
Zelin�rstv�	pou�iv� se v koncentraci 0,1–0,2 % bu� samotn�, nebo sou�asn� s aplikac� b���n�ch pesticid�. P�i rann�j�ch r�stov�ch f�z�ch se pou�iv� ni��i hranice doporu�en� koncentrace
Okrasn� rostliny	pou�iv� se v koncentraci 0,05–0,4 % s ohledem na druh a st�r� kultury. U rostlin s m�kk�mi, jemn�mi listy a u mlad�ch rostlin se pou�iv� spodn� hranice koncentrace. P�ipravek nezanech�v� na rostlin�ch skvrny, lze jej proto bez rizika pou�it� i t�sn� p�ed sklizn�. P�i hydroponii se p��pravek pou�iv� v koncentraci 0,005–0,2 % s ohledem na st�r� a druh kultury.

Příznaky nedostatku některých živin



Nedostatek železa a zinku (vinná réva)



Nedostatek manganu
(ječmen)



Nedostatek draslíku
(cukrová řepa)



Nedostatek fosforu (pšenice)



Nedostatek manganu (hrách)



Suspennzí hnojivo na bázi dusičnanu vápenatého a močoviny, obsahující dále hořčík a plně chelatizované stopové prvky pro použití v plodinách s vysokými nároky na vápník, zejména v ovocnářství, vinné révě, v zelinářství a v okrasných rostlinách. Hnojivo je určeno k použití na list. Rostlinami je rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody). Při jeho pravidelném používání není tedy jeho spotřeba rostlinami závislá na jeho množství a formě v půdě a intenzitě transpiračního proudu z kořenů do nadzemních částí rostliny a je zabráněno jeho deficitu.

Misitelnost:

Wuxal® SUS Kalcium je fyzikálně i chemicky misitelné s fungicidy i insekticidy, běžně se nacházejícími na trhu, po konzultaci s jejich výrobcí. Nedoporučujeme jej však používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordóské nebo sirovápenaté jichy a s polysulfidy. Wuxal® SUS Kalcium nedoporučujeme mísit s Wuxalem Boron Plus a Wuxalem SUS Kombi Mg. Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí Wuxalu s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 10l, 100l

plodina	dávkování, aplikační poznámky
Jádroviny	Proti chorobám z nedostatku vápníku se aplikuje současně s použitím běžných pesticidů. V jabloních se aplikuje od 3. ošetření proti strupovitosti po odkvětu (od června, zpravidla 6–10x, v pozdějších aplikacích doporučujeme nahradit hnojivem Wuxal Aminocal, které neobsahuje dusík), u náchylných odrůd (Cox Orange, Boskoop, Gravenstein, James Grieve apod.) v dávce 6 l/ha, u méně náchylných odrůd a u hrušní v dávce 3–4 l/ha.
Peckoviny	Proti nedostatku vápníku se používá v dávce 5–6 l/ha, aplikace 3–4x po cca 10 dnech počínaje v době 6–8 týdnů před sklizní
Jahody	Hnojivo se aplikuje pro zvýšení pevnosti plodů současně s fungicidními ošetřeními proti plísni šedé, dávka 6 l/ha.
Réva vinná	Přípravek se aplikuje od květu současně s běžně používanými pesticidy v dávce 4–5 l/ha pro omezení předčasného zasychání trápiny a zpevnění slupky bobulí; ukončit cca 14 dní před
Zelenina (zejména rajčata, paprika, okurky, salát, brukvovité aj.)	Hnojivo se aplikuje podle potřeby s ohledem na požadavky plodiny. K rajčatům a paprikám se aplikuje podle potřeby v 7–10 denních intervalech, poprvé 10 dní po nasazení plodů až do doby těsně před sklizní v dávce 3–6 l/ha na volném prostranství, pod fólií či sklem koncentrace 0,1–0,4%; ošetřuje se do sknutí. Okurky: poprvé krátce po nasazení plodů, opakovat po 14 dnech, naposledy 2 týdny před poslední sklizní. Dávka 5 l/ha. Salát, čínské zelí, květák: poprvé krátce po počátku tvoření hlávky, opakovat 1x týdně. Dávka 5 l/ha či koncentrace 0,3–0,5%; ošetřuje se do sknutí. Endivie: jedna aplikace 10–14 týdnů po výsadbě. Dávka 5 l/ha či koncentrace 0,3–0,5%; ošetřuje se do sknutí. Celer, čekanka, růžičková kapusta: jedna aplikace 5–7 týdnů před sklizní, postřik musí zasáhnout „srdéčko“. Dávka 5 l/ha či koncentrace 0,3–0,5%; ošetřuje se do sknutí.

Příznaky nedostatku vápníku



Jabloň



Slunečnice



Vysoce koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pro aplikaci na list. Hnojivo je možné použít ve všech polních plodinách, v ovocnářství, zelinářství i v okrasném zahradnictví, obzvláště tehdy, kdy je v půdě k dispozici dostatečná zásoba fosforu a rostliny mají zvýšené nároky na hořčík. Může být použit jak preventivně, tak i kurativně, po projevení se příznaků nedostatku hořčíku.

Misitelnost:

Wuxal® SUS Kombi Mg je fyzikálně a chemicky misitelný s fungicidy i insekticidy, běžně se nacházejícími na trhu, nedoporučujeme jej však používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeauxské nebo sirovápenaté jichy a s polysulfidy. Wuxal® SUS Kombi Mg nedoporučujeme mísit s Wuxalem Boron Plus a Wuxalem Super. Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí Wuxal® s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách. Hnojivo je třeba v obalu nejprve pečlivě rozmíchat a poté se vlije přes sítko do nádrže a spláchně vodou. Při rozpouštění je třeba udržovat míchadlo neustále v činnosti. Hnojivo lze rovněž přímo v obalu či v pomocné nádobě rozmíchat s vodou a vpravit do nádrže. Poté se za míchání doplní vody na stanovený objem. Při přípravě směsi s pesticidy se do nádrže vždy vpraví jako první Wuxal® a teprve poté se předepsaným postupem dávákuje příslušný pesticid.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 10l

plodina	dávkování, aplikační poznámka
Obilniny	je vhodné použít 2–4x a to v období od odnožování až do metání, dávka 3–5 l/ha
Kukuřice	aplikuje se 3x v období mezi fází 2–11 listů, dávka 3–5 l/ha
Brambory	aplikuje se 3x, poprvé počátkem tvorby poupat (fáze 50), opakuje se počátkem květu a 14 dní poté, dávka 5 l/ha
Cukrovka a krmná řepa	aplikuje se 3–5x od fáze 4 listů do uzavření rádků, dávka 5 l/ha
Chmel	v koncentraci 0,15 % se kombinuje s ošetřením proti peronospoře. Při použití úsporných postřiků nesmí koncentrace převýšit 0,3%. Při zvýšené potřebě dávkování zinku lze Wuxal SUS Kombi Mg používat ve směsi se síranem zinečnatým (0,2%). Ošetřuje se 2–4x. Ošetření lze rovněž kombinovat s Wuxalem Super (3–5 l/ha).
Ovocnářství	aplikace 2–3x v dávce 3–5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy, poprvé v růstové fázi těsně před vytvořením růžového poupěte (E2). V jabloních se v době po odkvětu doporučuje přejít na Wuxal SUS Kalcium.
Vinařství	aplikace v dávce 3–5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy proti peronospoře, celkem 5x
Okrasné rostliny	aplikuje se v koncentraci 0,05–0,1 % (50–100 ml na 100 l vody) v kombinaci s běžně používanými pesticidy. V mladších rostlinách a kulturách s měkkými, jemnými listy je vhodné použít spodní hranici uvedené koncentrace.

Příznaky nedostatku hořčíku




Vinná réva



Jabloň



Pšenice



Kukuřice



Řepka



Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně chelatizovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku P a také cílené předcházení latentního deficitu P.

Mísitelnost:

Wuxal® top P je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti před začátkem aplikace.

Upozornění:

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Balení: 20l, 200l

plodina	dávka	poznámka
Cukrová řepa	2–4 l/ha	1–2 aplikace ve fázi od 4 listů řepy do zakrytí řádků
Kukuřice	4 l/ha	1–2 aplikace ve fázi 2–6 listů kukuřice
Ovocné stromy	3 l/ha *)	3–4 aplikace od fáze poupat až do fáze plodu velikosti „oříšku“ *) aplikace v intervalu minimálně 8–10 dnů 4–5 aplikace od počátku léta
Réva vinná	2 l/ha	2–3 aplikace v období od tvorby bobulí do fáze zaměkání bobulí
Zelenina	4 l/ha	3–4 aplikace v období intenzivního růstu kultur

Příznaky nedostatku fosforu



Ječmen



Kukuřice



Řepka



Vinná réva



Řepka

Mísitelnost Wuxalů

	Wuxal® Amino	Wuxal® Aminocal	Wuxal® Boron Plus	Wuxal® Microplant	Wuxal® Oilseed
Wuxal® Amino		M	N	M	X
Wuxal® Aminocal	M		N	X	N
Wuxal® Boron Plus	N	N		N	N
Wuxal® Microplant	M	X	N		M
Wuxal® Oilseed	X	N	N	M	
Wuxal® Sulfur	M	X	M	M	M
Wuxal® Super	N	N	M	N	N
Wuxal® SUS Kalcium	M	M	N	X	N
Wuxal® SUS Kombi Mg	M	X	N	M	M
Wuxal® Top P	N	N	M	N	N

M – mísitelnost bez omezení

N – mísitelnost za určitých podmínek

X – nemísitelné

Mísitelnost Wuxalů – pokračování

	Wuxal [®] Sulfur	Wuxal [®] Super	Wuxal [®] SUS Kalcium	Wuxal [®] SUS Kombi Mg	Wuxal [®] Top P
Wuxal [®] Amino	M	N	M	M	N
Wuxal [®] Aminocal	X	N	M	X	N
Wuxal [®] Boron Plus	M	M	N	N	M
Wuxal [®] Microplant	M	N	X	M	N
Wuxal [®] Oilseed	M	N	N	M	N
Wuxal [®] Sulfur		M	X	M	M
Wuxal [®] Super	M		N	N	M
Wuxal [®] SUS Kalcium	X	N		X	N
Wuxal [®] SUS Kombi Mg	M	N	X		N
Wuxal [®] Top P	M	M	N	N	


M – mísitelnost bez omezení

N – mísitelnost za určitých podmínek

X – nemísitelné

Poznámky:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Ing. Jan Sixta

mobil: +420 604 275 777
jan.sixta@agroalliance.cz

Ing. David Král

mobil: +420 606 213 447
david.kral@agroalliance.cz

Ing. Tomáš Sobek

mobil: +420 602 490 053
tomas.sobek@agroalliance.cz

Ing. Jan Pecha

mobil: +420 725 880 334
jan.pecha@agroalliance.cz

Ing. Vladimír Pacík Ph.D.

mobil: +420 724 920 701
vladimir.pacik@agroalliance.cz

Listové analýzy a poradenství ve výživě rostlin:

Ing. Regina Čornejová, mobil: 731 114 693, e-mail: regina.cornejova@agroalliance.cz



S Vámi, pro Vás...