

CE

GLUCONEX Cu

JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI KFV 1.(C) (II) (a)

Hnojivo se stopovou živinou v komplexu s heptaglukonátem sodným v roztoku

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
6 %	měď (Cu) vodorozpustná v komplexu s HGA (80 g/l)

Roztokové hnojivo

Obsahuje vodorozpustný oxid sírový: 7,5 %

SLOŽKY:

Pentahydrát síranu měďnatého CAS: 7758-99-8 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
OBILNINY ozimé	2 l/ha	- 1-2 aplikace od začátečních stadií do velikosti klasu 1 cm
jarní	1 l/ha	- po vytvoření druhého kolínka
ŘEPKA	1-2 l/ha	prodlužovací růst
CUKROVÁ ŘEPA	1-2 l/ha	po zakrytí řádků 1 až 2 aplikace
KUKUŘICE	1 - 1.5 l/ha	1-2 aplikace na dobře vyvinutou listovou plochu
RÉVA	1-2 l/ha	6-7 aplikací před kvetením do tvorby plodů (dávku specifikovat podle odrůdy révy a odhadované výši sklizně)
ZELENINA plodová (rajčata, paprika, lilek ...) cibulová (česnek, cibule, pór ...) kořenová (celer, mrkev ...) salát (salát, eskariol, čekanka ...)	1-2 l/ha . . .	2-4 aplikace na plně vyvinutou listovou plochu . .
TYKVOVITÉ meloun, cuketa, okurky	1-2 l/ha	3 aplikace od tvorby plodů, v rozmezí 10 dnů
JAHOODY .	1-2 l/ha .	V roce výsadby - 3 aplikace v průběhu vegetace V roce sklizně: 3-4 aplikace ve fázi růstu (fáze B až G)
PECKOVINY broskvoně, meruňky, třešně, višně	2 l/ha .	ve fázi A / fázi B a E / fázi G a I (dávku specifikovat podle místních podmínek výživy a vegetace)
JÁDROVINY .	2 l/ha .	3 aplikace od fáze C do E. Potom 2-3 aplikace od fáze F do H. Neošetřujte odrůdy jablek a hrušek, které jsou náchylné k rzivosti

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

hustota: 1.305 kg/l

UPOZORNĚNÍ:

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu mohou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikačních termínů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

- Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
- Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední (zejména po práškových produktech). Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
- Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosah dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

PRVNÍ POMOC:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlažné čisté tekoucí vody alespoň 15 minut a současně odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Po dostatečném vymývání přiložte sterilní obvaz a VŽDY vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Postiženému nic nepodávejte ústy. Okamžitě vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

Množství: objem balení: 10 L; čistá hmotnost: 13,05 kg

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Alliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel: 257 830 138

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. www.agronutrition.fr

OZNAČENÍ:**Nebezpečí**

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Obsahuje: síran měďnatý pentahydrát; 2-aminoethanol

UFI : SPF0-Y0E1-200F-89EJ

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

LIKVIDACE: Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění tři krát vypláchněte. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY: Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována

za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.