

WUXAL Aminocal

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstraße 199, 40549 Düsseldorf, Německo

Dovozce/dodavatel: AGRO ALIANCE, s.r.o. V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: +420 (0)257 830 138

Evidenční číslo vzájemného uznání: V907

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost		Hodnota	Min.	Max.
vodorozpustný vápník jako CaO	% hm.	15	14	16
	g/l	202	189	216
vodorozpustný mangan jako Mn	% hm.	0,5	0,4	0,6
	g/l	6,7	5,4	8,1
vodorozpustný zinek jako Zn	% hm.	0,5	0,4	0,6
	g/l	6,7	5,4	8,1
Aminokyseliny	g/l	60	50	68
Výchozí materiály: Vyrobeno z 100 % vedlejších produktů živočišného původu z materiálů kategorie 3 zpracovaného dle Nařízení (ES) 1069/2009.				
pH		4,0	3,5	5,2

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

Rozsah a způsob použití:

Vysoce koncentrované listové hnojivo obsahující vápník pro předsklizňové použití v ovocných dřevinách, jahodách, zelenině a révě vinné. Vyvážená výživa rostlin vápníkem předchází rozvoji příznaků nedostatku vápníku (např. zlepšuje skladovatelnost). Wuxal Aminocal je speciální kapalné hnojivo s vysokým obsahem vápníku, obsahující stopové prvky Mn a Zn a dále adhezní činidlo. Wuxal Aminocal je určen jak pro preventivní použití, tak i k zabránění akutního nedostatku vápníku. Vzhledem ke speciální formulaci je vápník rychle přijímán listy a slupky plodů. WUXAL Aminocal obsahuje vysoce účinné a nízkomolekulární polypeptidové aditivum, které zlepšuje smáčení listů a plodů a zejména přilnavost formulace. Riziko smývání Ca po dešti se tak výrazně snižuje. Totéž platí pro přimíchané prostředky na ochranu rostlin. Nízké pH (4,0) zlepšuje příjem vápníku slupkou zralého ovoce.

Doporučené dávkování:

Nejlepšího účinku se dosahuje, pokud je Wuxal Aminocal aplikován brzy po ránu nebo v podvečer, nebo pokud je zataženo.

Jabloně, hrušně: Proti nedostatku vápníku se Wuxal Aminocal aplikuje 3-4x od počátku srpna resp. 3-5 týdnů před sklizní v dávce 5-10 l/ha (min. 600 l vody) v intervalech minimálně 8 dní – s ohledem na citlivost odrůdy (velmi náchylné odrůdy jsou např. Cox Orange, Boskoop, Gravenstein, James Grieve apod.), násadu a velikost plodů. Velmi důležité je zejména poslední ošetření cca. 14 dní před sklizní. Přípravek současně podporuje vybarvení plodů.

Třešně, višně: Wuxal Aminocal se proti nedostatku vápníku aplikuje 2-3x v dávce 5 l/ha po cca. 10 dnech počínaje v době 6-8 týdnů před sklizní. K prevenci a snadnějšímu překonání stresových stavů se aplikuje 2-3x během daného období v dávce 5 l/ha.

Švestky: Wuxal Aminocal se aplikuje nejlépe 4x, poprvé ihned po odkvětu a dále po 30, 60 a 90 dnech v dávce 5 l/ha.

Réva vinná: Hnojivo zpevňuje rostlinná pletiva a omezuje předčasné ochrnutí stopek hroznů. Aplikuje se po odkvětu současně s běžně používanými pesticidy. Proti předčasnému ochrnutí stopek se aplikuje těsně před nebo na počátku zaměkání. Ošetření 2-3x opakovat v intervalu 7-10 dní. Ukončit cca. 14 dní před sklizní. Dávka 5 l/ha.

Zelenina (zejména rajčata, paprika, okurky, salát, brukvovité aj.): Wuxal Aminocal se aplikuje podle potřeby s ohledem na požadavky plodiny. U polních kultur v dávce 5 l/ha, pod fólií či sklem se použije dávky 200-250 ml/100 l vody.

K rajčatům a paprikám se aplikuje podle potřeby v 7-10 denních intervalech, poprvé 10 dní po nasazení plodů až do doby těsně před sklizní.

Okurky: poprvé krátce po nasazení plodů, opakovat po 14 dnech, naposledy 2 týdny před poslední sklizní.

Salát, čínské zelí, květák: poprvé krátce po počátku tvoření hlávky, opakovat 1x týdně.

Endivie: jedna aplikace 10-14 týdnů po výsadbě.

Celer, čekanka, růžičková kapusta: jedna aplikace 5-7 týdnů před sklizní, postřik musí zasáhnout „srdéčko“.

Upozornění:

Při potřebě ošetření jaderovin proti nedostatku vápníku počátkem vegetace doporučujeme používat spíše WUXAL SUS Kalcium, který je lépe snášen, než WUXAL Aminocal.

Mísitelnost, příprava postřiku.

Wuxal Aminocal je mísitelný s běžně používanými pesticidními přípravky. V každém případě však doporučujeme provést předem před prvním použitím pro zvýšení jistoty test na mísitelnost.

Při ředění je nutno zachovávat následující postup.

1. Do nádrže dát cca. $\frac{3}{4}$ množství vody.
2. Zapnout míchání.
3. Přidat odměřené množství WUXAL Aminocal. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
4. Poté eventuálně přidat pesticidní přípravky.
5. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem
6. Připravenou jichu je nutno co nejrychleji vystříkat, nelze ji připravovat do zásoby.

Wuxal Aminocal nemíchat s listovými hnojivo obsahujícími fosfor jako WUXAL TOP P.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při používání nejzte a nepijte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Podmínky skladování:

Hnojivo je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte produkt před znečištěním, vyschnutím a před mrazem, teplotami pod + 5 °C a nad + 40 °C. Doporučuje se uskladnit produkt tak aby byl chráněn před vlivy počasí, slunečním zářením, přehřátím a znečištěním. Zabraňte většímu kolísání teplot.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete práci, zajistěte tělesní a duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

Při zasažení kůže:

Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem. Pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Hnojivo se dodává balené.

Objem balení: ____ L

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu

OZNAČENÍ:



VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě

UFI: 4UA0-X0SM-C006-5J2X

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.