

CE		
CEREFOL Multi		
Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami – KfV1(C)(I)(b)(i) Suspenzní hnojivo N, MgO (3,4-15,9) se stopovými živinami měď (Cu, uhličitán), mangan (Mn, uhličitán) a zinek (Zn, oxid)		
3,4 %	Celkový dusík (N)	
3,4 %	Celkový močovinový dusík (N)	
15,9 %	Celkový oxid hořečnatý (MgO)	
3 %	Celková měď (Cu, uhličitán)	
8 %	Celkový mangan (Mn, uhličitán)	
4,9 %	Celkový zinek (Zn, oxid)	
SLOŽKY hydroxid hořečnatý CAS: 1309-42-8 (KSM1*); uhličitán manganatý CAS: 598-62-9 (KSM1*); oxid zinečnatý CAS: 1314-13-2 (KSM1*); uhličitán měďnatý CAS: 12069-69-1 (KSM1*); močovina CAS 57-13-6 (KSM1*) *KSM1: Látky a směsi z původního materiálu.		
NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ		
Plodina	Dávka	Poznámka
obilniny	1-2 l/ha	1 aplikace od 2 listů do fáze prvního kolénka. Opakovat v případě potřeby (vážného nedostatku)
kukuřice	1-2 l/ha	jedna aplikace ve fázi od 4 - 8 listů
fazol luskový	2 l/ha	jedna aplikace ve fázi 4 - 6 listů
zelenina (česnek, cibule, mrkev, pór, artyčok, špenát)	2 l/ha	dělená aplikace
travní porosty (pastviny)	2 l/ha	aplikace na jaře po obnovení vegetace. V případě silného nedostatku opakovat aplikaci po 14 dnech.
louky (siláž / seno)	2 l/ha	aplikuje 15 až 21 dnů před sekáním
Listová aplikace: Dávka: 1 - 2 l/ha, maximální koncentrace: 1.5 %		
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.		
UPOZORNĚNÍ Pro dosažení co nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28°C. Vhodná teplota k aplikaci 6 – 25 °C. Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.		
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI 1. Nádrž postřikovače naplňte vodou do poloviny požadovaného množství a zahajte míchání. 2. Přidejte požadované množství CEREFOL Multi a přidejte zbytek vody. Míchání ponechte nepřetržitě zapnuté. Při kombinaci s ostatními komponentami v nádrži vždy přidejte CEREFOL Multi po práškovém hnojivu. Ujistěte se, aby míchání zůstalo zapnuté. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.		
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.		

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Při používání nejzte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci. Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Výrobek je klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Viz příslušná označení na obalu.



VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č.: 220-239-6) 3:1. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č. : 220-239-6) 3:1

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

První pomoc:

Projev-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie, tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00

Distributor: Agro Alliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel: 257 830 138

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech