

CE

WUXAL Super

VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI - KfV1 (C)(I)(b)(ii)

Hnojivo NPK (S) se stopovými živinami, 8-8-6 (+2,3). V roztoku.

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
8,0	dusík celkový 99,2 g/l
2,3	dusičnanový dusík 28,5 g/l
3,7	amonný dusík 45,9 g/l
2,0	močovinový dusík 24,8 g/l
8,0	(P ₂ O ₅) celkový oxid fosforečný 99,2 g/l
8,0	(P ₂ O ₅) vodorozpustný oxid fosforečný 99,2 g/l
6,0	(K ₂ O) vodorozpustný oxid draselný 74,4 g/l
2,25	(SO ₃) vodorozpustný oxid sírový 27,9
0,01	(B) vodorozpustný bor jako kyselina boritá 0,12 g/l
0,004	(Cu) vodorozpustná měď v chelátu s EDTA* 0,05 g/l
0,02	(Fe) vodorozpustné železo v chelátu s EDTA* 0,25 g/l
0,012	(Mn) vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA* 0,15 g/l
0,001	(Mo) vodorozpustný molybden jako molybdenan sodný 0,012 g/l
0,004	(Zn) vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA* 0,05 g/l

nízký obsah chloridu

*Rozsah pH zaručující přijatelnou chelatační stabilitu

Cu-EDTA: 1,5 – 10; Fe-EDTA: 1,5 – 6,5; Mn-EDTA: 3,0 – 8,0; Zn-EDTA: 2,0 – 9,0

SLOŽKY:

Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Dusičnan draselný CAS: 7757-79-1 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Roztok dusičnanu amonného CAS: 6484-52-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Močovina CAS: 57-13-6 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Síran amonný CAS: 7783-20-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Amoniak CAS: 7664-41-7 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

Kapalné hnojivo s nízkým obsahem chloru pro použití v polních plodinách, zelinářství, okrasných rostlinách, ovocných dřevinách, vinné révě a ve školkách. Používá se pro aplikaci jak na list, tak případně do půdy (zejména v zahradnictví). Stopové živiny jsou v chelátové vazbě a jsou proto rostlinami snadno přijímány.

- Ve školkách ovocných a okrasných dřevin v nejmladších růstových stádiích (po vytvoření prvních listů) postřik nebo zálivky o konc. 0,1 %, později 0,2 %. Při zálivce zamlžováním lze pokaždé WUXAL Super přidat v koncentraci 0,05 %. V pozdějších vývojových stádiích lze WUXAL Super v koncentraci 0,2 % používat i při aplikacích všech běžně používaných pesticidů.

- V zelinářství se WUXAL Super ve sklenicích používá v koncentraci 0,1–0,2 % buď samotný, nebo současně s aplikací běžných pesticidů. Při rannějších růstových fázích se používá nižší hranice doporučené koncentrace.

- Polní zelenina – okurky, rajčata, paprika – dávka 5 l/ha, ošetření 2x před květem a dále 3–4x v intervalech 14 dní, dávka 5 ml/10m².

- Brukvovitá zelenina, salát – ošetření 4x, poprvé po výsadbě, poté v cca. 10 denních intervalech, koncentrace

0,1–0,2 %.

- Mrkev – doporučuje se 6 ošetření v dvoutýdenních intervalech, dávka 5 ml/10 m².
- Na okrasných rostlinách se WUXAL Super používá v koncentraci 0,05–0,4 % s ohledem na druh a stáří kultury. U rostlin s měkkými, jemnými listy a u mladších rostlin se používá spodní hranice koncentrace. Přípravek nezanechává na rostlinách skvrny, lze jej proto bez rizika použít i těsně před sklizní. Při hydroponii se přípravek používá v koncentraci 0,005–0,2 % s ohledem na stáří a druh kultury.
- Polní plodiny: přípravek lze použít současně s běžnými pesticidy v dávce 50 ml/100 m².
- V ovocných dřevinách a révě vinné lze WUXAL Super použít současně s ošetřením běžnými pesticidy, koncentrace 0,3 %.
- Brambory: dávka 50 ml/100 m², ošetření 2x před květem, 3–4x po odkvětu, interval cca 3 týdny.
- Kukuřice: ošetřuje se 4x, poprvé při výšce rostlin 15–25 cm, poté ve dvoutýdenních intervalech, dávka 50 ml/100 m².
- Melouny, cibule: ošetřuje se 4x, poprvé měsíc po vzejítí, dále ve dvoutýdenních intervalech, dávka 50 ml/100 m².
- Jahodník: ošetření 1x týdně, koncentrace 0,1–0,2 %.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

Hnojivo je třeba nejprve v obalu pečlivě rozmíchat a poté přes sítko vylít do nádrže a spláchnout vodou. Při rozpouštění je třeba udržovat míchací zařízení v činnosti. • Při přípravě směsi s pesticidy se do nádrže vždy vlije jako první WUXAL a teprve poté se předepsaným postupem dává příslušný pesticid. Hnojivo je fyzikální a chemicky mísitelné s fungicidy i insekticidy, které jsou běžně dostupné na trhu. Možnost míchání musí být konzultována s výrobcem pesticidu. Nedoporučujeme jej používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeauxské nebo sírovápenaté směsi a polysulfidy. Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí WUXALu s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Přípravek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů, hořlavých látek, obalů od těchto látek a látkami, které s dusičnanem amonným vytvářejí velmi nebezpečné sloučeniny. Chraňte před znečištěním, přímým slunečním zářením, vysušením, teplotami pod +5 °C a nad +40 °C, před častými změnami teplot a mechanickým poškozením. Neskladujte v kovových obalech (riziko koroze). Krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5 °C může dojít ke změně barvy a vyloučení krystalů. Tato skutečnost není na závadu jeho jakosti, při přípravě aplikační kapaliny dojde ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobku při teplotách okolo 20 °C za občasného promíchání či protřepání.

Nutno zabránit vyschnutí přípravku – v krystalickém stavu v případě kontaktu s hořlavými látkami podporuje hoření a může zapříčinit výbuch.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání (tel.: 257 830 138)

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

Dodržujte pokyny pro doporučené používání tohoto hnojivého výrobku, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

PRVNÍ POMOC:

Projevily-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Pacienta okamžitě vynést ze zamořené místnosti a nechat jej odpočívat na dobře větraném místě. Lékařské vyšetření je potřebné jestliže postižený má problémy s dýcháním.

Při zasažení kůže:

Svlékněte kontaminovaný oděv. Postiženou část kůže neprodleně důkladně omýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. V případě potřeby přivolejte lékaře.

Při zasažení očí:

Důkladně vymýt oči při plném otevření očních víček pod tekoucí vodou (chraňte nezasažené oko, sundejte kontaktní čočky). V případě potřeby přivolejte očního specialistu.

Při náhodném požití:

Okamžitě vypláchněte postiženému ústa vodou a následně podejte velké množství vody. V případě přetrvávajících potíží přivolejte lékaře.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Množství: objem balení: 20 L; 200 L; čistá hmotnost: 24,8 kg; 248 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdtter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, Německo. Telefon: +49 (0) 2 11/50 64 a

OZNAČENÍ:

Směs není klasifikována jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008/ES (CLP)

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.