

CE

**GLUCONEX Cu**

JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI KVV 1(C)(II)(a)

Hnojivo se stopovou živinou v komplexu s heptaglukonátem sodným v roztoku

**ŽIVINY:**

| % hmotnostní | živina                                           |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 6 %          | měď (Cu) vodorozpustná v komplexu s HGA (80 g/l) |

Roztokové hnojivo

**SLOŽKY:**

Pentahydrát síranu měďnatého CAS: 7758-99-8 (KSM1\*)

KSM1\*: Látky a směsi z původního materiálu

Obsahuje vodorozpustný oxid sírový: 7,5 %

**NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:**

| plodina                                                                                                                                                        | dávka            | poznámka                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBILNINY<br>ozimé<br>jarní                                                                                                                                     | 2 l/ha<br>1 l/ha | - 1-2 aplikace od začátečních stadií do velikosti klasu 1 cm<br>- po vytvoření druhého kolínka                                   |
| ŘEPKA                                                                                                                                                          | 1-2 l/ha         | prodlužovací růst                                                                                                                |
| CUKROVÁ ŘEPA                                                                                                                                                   | 1-2 l/ha         | po zakrytí řádků 1 až 2 aplikace                                                                                                 |
| KUKUŘICE                                                                                                                                                       | 1 – 1,5 l/ha     | 1-2 aplikace na dobře vyvinutou listovou plochu                                                                                  |
| RÉVA                                                                                                                                                           | 1-2 l/ha         | 6-7 aplikací před kvetením do tvorby plodů (dávku specifikovat podle odrůdy révy a odhadované výši sklizně)                      |
| ZELENINA<br>plodová (rajčata, paprika, lilek ...)<br>cibulová (česnek, cibule, pór ...)<br>kořenová (celer, mrkev ...)<br>salát (salát, eskariol, čekanka ...) | 1-2 l/ha         | 2-4 aplikace na plně vyvinutou listovou plochu                                                                                   |
| TYKVOVITÉ meloun, cuketa, okurky                                                                                                                               | 1-2 l/ha         | 3 aplikace od tvorby plodů, v rozmezí 10 dnů                                                                                     |
| JAHOODY                                                                                                                                                        | 1-2 l/ha         | V roce výsadby - 3 aplikace v průběhu vegetace<br>V roce sklizně: 3-4 aplikace ve fázi růstu (fáze B až G)                       |
| PECKOVINY<br>broskvoně, meruňky, třešně, višně                                                                                                                 | 2 l/ha           | ve fázi A / fázi B a E / fázi G a I (dávku specifikovat podle místních podmínek výživy a vegetace)                               |
| JÁDROVINY                                                                                                                                                      | 2 l/ha           | 3 aplikace od fáze C do E. Potom 2-3 aplikace od fáze F do H. Neošetřujte odrůdy jablek a hrušek, které jsou náchylné k rzivosti |

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

hustota: 1,305 kg/l

### **UPOZORNĚNÍ:**

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikačních termínů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny.

### **PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:**

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední (zejména po práškových produktech). Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení

### **PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:**

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

### **INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:**

Před použitím si přečtěte návod k použití. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

### **PRVNÍ POMOC:**

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

#### **Při nadýchání:**

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

#### **Při zasažení kůže:**

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

#### **Při zasažení očí:**

Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlahe čisté tekoucí vody alespoň 15 minut a současně odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Po dostatečném vymývání přiložte sterilní obvaz a VŽDY vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

#### **Při náhodném požití:**

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Postiženému nic nepodávejte ústy. Okamžitě vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc a ukažte štítek / etкетu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

### **OZNAČENÍ:**



### **Nebezpečí**

**H302 Zdraví škodlivý při požití.**

---

**H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.**

**H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Obsahuje: síran měďnatý pentahydrát EC 231-847-6; 2-aminoethanol EC 205-483-3

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

**LIKVIDACE:** Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění tři krát vypláchněte. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

**ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY:** Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoli druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Množství: Objem balení: 10 L; čistá hmotnost: 13,05 kg

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Distributor:** Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel: 257 830 138

**Výrobce:** AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie.

[www.agronutrition.fr](http://www.agronutrition.fr)

**Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.**