

CE		
Mg 85 S		
Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami – KfV 1(C)(I)(b)(ii) Hnojivo se síranem hořečnatým v roztoku (Mg, S) (6,9-13,5)		
6,9 %	Oxid hořečnatý (MgO) vodorozpustný	
13,5 %	Oxid sírový (SO ₃) vodorozpustný	
SLOŽKY Síran hořečnatý CAS: 7487-88-9 (KSM1*) *KSM1: Látky a směsi z původního materiálu.		
NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ		
Plodina	Dávka	Poznámka
Řepka olejka	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha.	1 aplikace na začátku dlouhivého růstu. V případě deficitu 2 aplikace ve stadiu 4 až 6 listů a na začátku dlouhivého růstu. Neaplikovat v době květu. Lze po odkvětu.
Obiloviny	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha.	Podzim: 1 aplikace v stadiu 2 – 3 listy Jaro: 1-2 aplikace do konce odnožování
Kukuřice	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha.	1 aplikace v stadiu 4 až 6 listů
Brambory	3 – 4 l/ha	1-2 aplikace po plném zapojení porostu
Cukrová řepa	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha.	1 – 2 aplikace ve stadiu 4 – 6 listů
Zelenina	3 – 4 l/ha min. 150 l vody/ha	1 až 2 aplikace v 10 – 14 denních intervalech na dobře založený porost
Vinná réva	4 – 8 l/ha min. 200 l vody/ha	2 až 3 aplikace před a po kvetení, potom 3 – 4 aplikace po uzavírání hroznů
Ovocné stromy	4 – 6 l/ha min. 150 l vody/ha	3 – 4 aplikace od opadu okvětních lístků a potom každých 10 – 15 dní
UPOZORNĚNÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu mohou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.		
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSY 1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.		
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.		
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci. Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.		

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Výrobek není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obzřete speciální instrukce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie, tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00

Distributor: Agro Alliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, IČ: 61172553, tel: 257 830 138

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech