

CE

WUXAL TOP P

VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI – KfV 1(C)(I)(b)(ii)

Roztokové hnojivo NPK (S) se stopovými živinami, 5-20-5 (+1)

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
5,0 %	(N) dusík celkový (63,8 g/l)
5,0 %	amonný dusík (63,8 g/l)
20,0 %	(P ₂ O ₅) oxid fosforečný celkový (255 g/l)
20,0 %	(P ₂ O ₅) vodorozpustný oxid fosforečný (255 g/l)
5,0 %	(K ₂ O) vodorozpustný oxid draselný (63,8 g/l)
1,0 %	(SO ₃) vodorozpustný oxid sírový (12,8 g/l)
0,01 %	(B) vodorozpustný bor jako kyselina boritá (0,13 g/l)
0,004 %	(Cu) vodorozpustná měď v chelátu s EDTA* (0,05 g/l)
0,02 %	(Fe) vodorozpustné železo v chelátu s EDTA* (0,25 g/l)
0,012 %	(Mn) vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA* (0,15 g/l)
0,001 %	(Mo) vodorozpustný molybden jako molybdenan sodný (0,013 g/l)
0,004 %	(Zn) vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA* (0,05 g/l)

* Rozsah pH zaručující přijatelnou chelatační stabilitu

Cu-EDTA: 1,5 – 10; Fe-EDTA: 1,5 – 6,5; Mn-EDTA: 3,0 – 8,0; Zn-EDTA: 2,0 – 9,0

SLOŽKY:

Fosforečnan diamonný CAS: 7783-28-0 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Hydroxid draselný CAS: 1310-58-3 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Chlorid draselný CAS: 7447-40-7 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
Cukrová řepa	2 - 4 l/ha	1 – 2 aplikace ve fázi od 4 listů řepy do zakrytí řádků
Kukuřice	4 l/ha	1 – 2 aplikace ve fázi 2 – 6 listů kukuřice
Ovocné stromy	3 l/ha *)	3 – 4 aplikace od fáze poupat až do fáze plodu velikosti „oříšku“ *) aplikací v intervalu minimálně 8 – 10 dnů 4 – 5 aplikace od počátku léta
Réva vinná	2 l/ha	2 – 3 aplikace v období od tvorby bobulí do fáze zaměkání bobulí
Zelenina	4 l/ha	3 – 4 aplikace v období intenzivního růstu kultur

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně chelatizovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku P a také cílené předcházení latentního deficitu P.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

Wuxal Top P je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti před začátkem aplikace.

Při ředění je nutno zachovávat následující postup.

1. Do nádrže dát cca ¾ množství vody.
2. Zapnout míchání.

-
3. Přidat odměřené množství hnojiva. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
 4. Poté eventuálně přidat pesticidní přípravky.
 5. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem
 6. Připravenou jichu je nutno co nejrychleji vystříkat, nelze ji připravovat do zásoby.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladovat v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte před znečištěním, vysušením a před mrazem, teplotami pod +5 °C a nad +40 °C. Zajistěte, aby v průběhu skladování nedocházelo k většímu kolísání teplot.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. (tel.: 046 540 05 01)

Dodržujte pokyny pro doporučené používání tohoto hnojivého výrobku, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

PRVNÍ POMOC:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přežívají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením oka odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Množství: objem balení: 20 L; čistá hmotnost: 25,5 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.

OZNAČENÍ:

Směs není klasifikována jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008/ES (CLP)

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.