

CE		
ACTIFLOW Mn560		
Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami – KfV 1(C)(II)(a)		
Suspenzní hnojivo s uhličitánem manganatým (Mn) (28)		
28,5 %	mangan (Mn) vodorozpustný	
4,7 %	celkový dusík (N)	
4,7 %	močovinový dusík (N)	
SLOŽKY Uhličitán manganatý CAS: 598-62-9 (KSM1*), Močovina CAS 57-13-6 (KSM1*) *KSM1: Látky a směsi z původního materiálu.		
NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ		
Plodina	Dávka	Poznámka
Obilniny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1-2 aplikace od stadia 2. listu až do prvního kolínka
Kukuřice	0,5 - 1 l/ha min. 150 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 4-8 listů
Řepka a brukvovité	0,5 – 1 l/ha min. 150 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 4-6 listů
Luskoviny	0,5 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 0,5 l/ha od stadia 2 plně vyvinutých listů
	1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 1 l/ha od začátku kvetení až do dalších 5 dnů
Cukrovka	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 4-6 listů
Brambory	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 2-3 týdny po vzejití
Listová zelenina, kořenová zelenina	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 10 - 15 cm
Jádroviny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	Nedostatek: 1 aplikace před kvetením, a 1 aplikace po odkvětu. Na zelených odrůdách zlepšuje zelené zbarvení: 6 aplikací od stadia vývoje plodů po dobu 1 měsíce. Aplikační dávky lze opakovat od fáze nasazení plodů až 1 měsíc před sklizní na základě analýzy.
Peckoviny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace od nasazení plodů další dle potřeby (analýza).
Vinná réva	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 – 3 aplikace od stadia květenství zřetelně viditelné / oddělování jednotlivých květů / nasazení bobulí.
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.		
UPOZORNĚNÍ Pro dosažení co nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství vody minimálně 150 l/ha (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28° C. Vhodná teplota k aplikaci 6 – 25 °C. Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.		

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
2. Přidejte potřebné množství hnojiva, a poté přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, toto hnojivo přidávejte vždy až po práškových produktech. Neponechávejte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci. Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Výrobek není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH208 Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES číslo 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obzaušte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie, tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00

Distributor: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, IČ: 61172553, tel: 257 830 138

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech