

WUXAL® BORON PLUS

Složení: 5 % celkový N (70 g/l) – 0,4 % dusičnanový dusík,
4,6 % amonný dusík, 13 % vodorozpustný P₂O₅ (183 g/l), 7,7 % vodorozpustný B
(108 g/l), 0,05 % vodorozpustná Cu v chelátu s EDTA (0,7 g/l),
0,1 % vodorozpustné Fe v chelátu s EDTA (1,4 g/l), 0,05 % vodorozpustný
Mn v chelátu s EDTA (0,7 g/l), 0,001 % vodorozpustný Mo (0,014 g/l),
0,05 % vodorozpustný Zn v chelátu s EDTA (0,7 g/l)

Wuxal Boron Plus je suspenze pro listovou aplikaci, která zaručuje vysoce účinný příjem bóru listy a pletivy rostlin. Wuxal Boron Plus má stimulační účinek na rostliny, které jsou ve fyziologickém stresu v časných fázích růstu a je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin. Výsledkem je vyšší výnos a vyšší kvalita úrody.

Wuxal Boron Plus vyrovnává pH aplikační kapaliny na úroveň, která je pro rostliny fyziologicky dobře přijatelná.

Balení: 10l a 100l

DOPORUČENÍ K APLIKACI

| Plodina | Dávka | Poznámka |
|--|----------|--|
| Cukrová řepa pro vyšší úrody cukru a na podporu odolnosti proti suché hniloba a hnilobě srdíčka řepy | 1–2 l/ha | 2 aplikace – ve fázi 4–6 listů – krátce před zapojením porostu |
| Řepka olejka pro vyšší úrodu oleje a na podporu dobrého vývinu šešulí a semen | 1–2 l/ha | 2 aplikace – prodlužovací růst – ve stadiu butonizace až do začátku kvetení |
| Kukuřice pro zvýšení výnosu i kvality úrody kukuřice | 1–2 l/ha | 1–2 aplikace – na začátku růstu, ve stádiu 4–5 listů – na začátku prodlužovacího růstu, v stadiu 7–9 listů |
| Slunečnice pro zvýšení výnosu | 1 l/ha | 1–2 aplikace – před květem |
| Jádroviny podpora kvetení a zvýšení jemnosti slupky plodů | 1 l/ha | 3 aplikace – kvetení – stadium růstu – po sklizni |
| Peckoviny pro lepší nasazení květů a podporu kvetení | 1–2 l/ha | 2 aplikace – začátek plného květu – po sklizni |
| Réva vinná proti opadu květů a mladých plodů | 1–2 l/ha | 2 aplikace – před květem – na konci kvetení |
| Zelenina (Zelí, mrkev, celer, fazole, hrách, ředkvička, salát hlávkový) – zvýšení kvality | 1–2 l/ha | 2–3 aplikace – obecně 2–3 týdny po přesazení – opakovat v 8–10 denních intervalech – zelí: ve stádiu 4–6 listů, na počátku tvorby hlávky |

Wuxal Boron Plus se doporučuje zejména pro ovocné plodiny, vinnou révu, zeleninu a plodiny na orné půdě, při nichž se nedostatek bóru často vyskytuje spolu se „skrytým“ nedostatkem jiných stopových živin. Vyvážená výživa hnojivem Wuxal Boron Plus předchází rozvoji rziivosti slupky na citlivých odrůdách jádrového ovoce a zároveň podporuje rychlost buněčného dělení důsledkem vysokého obsahu P a N. Výsledkem je optimální růst ovoce.

Wuxal Boron Plus obsahuje speciální aditiva, která zaručují dobrou odolnost vůči dešti a vynikající přilnavost i za nepříznivých klimatických podmínek. Aby se dosáhlo zlepšení účinku aplikovaného hnojiva, aplikovat třeba brzy ráno, skoro večer nebo za oblačného počasí.

MÍŠITELNOST

I když je Wuxal Boron Plus kompatibilní s nejběžněji používanými přípravky na ochranu rostlin, doporučujeme při prvním použití otestovat kompatibilitu směsi. Při plnění nádrže dodržujte následující posloupnost:

1. nádrž naplňte částečným množstvím vody např. 1/3
2. zapněte míchání
3. přidejte Wuxal Boron Plus
4. v případě potřeby další hnojiva typu Wuxal
5. v případě potřeby přidejte pesticidy
6. nádrž doplňte vodou
7. připravenou aplikační směs aplikujte bez zbytečného prodlení