

# WUXAL® TOP P

## Složení:

5 % celkový N (65 g/l); 20 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (260 g/l); 5 % K<sub>2</sub>O (65 g/l);  
0,02 % B (0,26 g/l); 0,05 % Cu (0,65 g/l); 0,1 % Fe (1,3 g/l);  
0,05 % Mn (0,65 g/l); 0,001 % Mo (0,013 g/l); 0,05 % Zn (0,65 g/l);  
kationty mědi, manganu, zinku a železa jsou plně chelativizovány (EDTA)

Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně chelativizovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku p a také cílené předcházení latentního deficitu P

Balení: 10l, 100l

## DOPORUČENÍ K APLIKACI

Plodina	Aplikace, dávkování
Cukrová řepa	1–2x dávka 2–4 l/ha Ve fázi od 4 listů řepy do zakrytí řádků.
Kukuřice	1–2x dávka 4 l/ha Ve fázi 2–6 listů kukuřice.
Ovocné stromy	3–4x dávka 3 l/ha od fáze poupat až do fáze plodu velikosti oříšku 4–5x dávka 3 l/ha od počátku léta
Réva vinná	2–3x dávka 2 l/ha v období od tvorby bobulí do fáze zaměkání bobulí.
Zelenina	3–4x dávka 4 l/ha v období intenzivního růstu kultur.

## Úprava pH postřikové jichy (pufrovací schopnost):

1,0 l/ha pro polní plodiny (150–400l postřikové jichy)  
1,0–2,0 l/ha pro speciální plodiny (500–1 000l postřikové jichy)

## MÍSITELNOST

Wuxal Top P je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti před začátkem aplikace.

## POZNÁMKA

Wuxal Top P obsahuje značný nadbytek chelativizačního činidla, a proto roztoky s tímto listovým hnojivem mají **vysokou pufrovací schopnost** této schopnosti se využívá při korekci hodnoty pH u tvrdé vody (zejména při aplikaci herbicidů do cukrovky) a pro stabilizaci postřikové jichy při aplikaci vícenásobných tank-mix směsí.

**pH koncentráту: 5,8**