

CE

WUXAL Boron Plus

VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI KfV 1(C)(I)(b)(ii)

Hnojivo NP se stopovými živinami, 5-13. V suspenzi.

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
5 %	(N) Dusík celkový (70 g)
0,4 %	dusičnanový dusík (5 g/l)
4,6 %	amonný dusík (65 g/l)
13 %	(P ₂ O ₅) Oxid fosforečný celkový 183 g/l)
13 %	(P ₂ O ₅) vodorozpustný oxid fosforečný (183 g/l)
7,7 %	(B) vodorozpustný bor jako kyselina boritá (108 g/l)
0,05 %	(Cu) vodorozpustná měď v chelátu s EDTA* (0,7 g/l)
0,1 %	(Fe) vodorozpustné železo v chelátu s EDTA* (1,4 g/l)
0,05 %	(Mn) vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA* (0,7 g/l)
0,001 %	(Mo) vodorozpustný molybden (0,014 g/l) jako molybdenan sodný
0,05 %	(Zn) vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA* (0,7 g/l)

nízký obsah chloridu

*Rozsah pH zaručující přijatelnou chelatační stabilitu

Cu-EDTA: 1,5 – 10; Fe-EDTA: 1,5 – 6,5; Mn-EDTA: 3,0 – 8,0; Zn-EDTA: 2,0 – 9,0

SLOŽKY:

Kyselina boritá CAS: 10043-35-3 (KSM1*)

Fosforečnan diamonný CAS: 7783-28-0 (KSM1*)

Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (KSM1*)

KSM1*: Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
CUKROVÁ ŘEPA pro vyšší úrody cukru a na podporu odolnosti proti suché hnilobě a hnilobě srdíčka řepy	1 - 2 l/ha	2 aplikace - ve fázi 4 - 6 listů - krátce před zapojením porostu
ŘEPKA OLEJNÁ pro vyšší úrodu oleje a na podporu dobrého vývinu šesulí a semen	1 - 2 l/ha	2 aplikace - prodlužovací růst - ve stadiu butonizace až do začátku kvetení
KUKUŘICE pro zvýšení výnosu i kvality úrody kukuřice	1 - 2 l/ha	1-2 aplikace - na začátku růstu, ve stádiu 4-5 listů - na začátku prodlužovacího růstu, v štádiu 7-9 listů
SLUNEČNICE pro zvýšení výnosu	1 l/ha	1-2 aplikace - před květem
JÁDROVINY podpora kvetení a zvýšení jemnosti slupky plodů	1 l/ha	3 aplikace - kvetení - stadium růstu - po sklizni
PECKOVINY Pro lepší nasazení květů a podporu kvetení	1 - 2 l/ha	2 aplikace - začátek plného květu

		- po sklizni
RÉVA Proti opadu květů a mladých plodů révy	1 - 2 l/ha	2 aplikace - před květem - na konci kvetení
ZELENINA (Zelí, mrkev, celer, fazole, hrách, ředkvička, salát hlávkový) zvýšení kvality	1 - 2 l/ha	2-3 aplikace - obecně 2-3 týdny po přesazení - opakovat v 8-10 denních intervalech - zelí: ve stádiu 4-6 listů, na počátku tvorby hlávky

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

POKYNY PRO POUŽITÍ:

WUXAL Boron Plus je vysoce koncentrované borové hnojivo obsahující plně chelatizované stopové živiny pro plodiny s vysokým nárokem na obsah boru jako je cukrovka, řepka olejka, ovoce a zelenina. WUXAL Boron Plus je použitelný až do 40 ° dH (stupeň tvrdosti vody).

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

I když je WUXAL Boron Plus kompatibilní s nejběžněji používanými přípravky na ochranu rostlin, doporučujeme při prvním použití otestovat kompatibilitu směsi. Při plnění nádrže dodržujte následující posloupnost:

1. nádrž naplňte částečným množstvím vody např. 1/3
2. zapněte míchání
3. přidejte WUXAL Boron Plus
4. v případě potřeby přidejte další hnojiva typu WUXAL
5. v případě potřeby přidejte pesticidy
6. nádrž doplňte vodou
7. připravenou aplikační směs aplikujte bez zbytečného prodlení

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Hnojivo je třeba skladovat v dobře uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzavřených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Neskladujte v kovových obalech (riziko koroze). Chraňte produkt před znečištěním, vyschnutím, teplotami pod + 5 °C a nad 40 °C a častými změnami teplot. I v důsledku krátkodobého vystavení výrobku teplotám pod + 5 °C může dojít ke změně barvy a vzniku krystalů. Tato skutečnost nezpůsobuje snížení kvality, během přípravy aplikační kapaliny se krystaly rychle rozpustí. Krystaly lze také rozpustit dlouhodobějším ponecháním výrobku při teplotách okolo 20 °C při občasné promíchání nebo protřepání.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. (tel.: 257 830 138)

Dodržujte pokyny pro doporučené používání tohoto hnojivého výrobku, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Bezpečnostní opatření: Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po skončení práce umýt ruce a obličej. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

PRVNÍ POMOC:

Pokud se projeví zdravotní potíže nebo v případě pochybností informujte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety nebo příbalové informace.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný a duševní klid.

Při zasažení kůže:

Svlékněte znečištěný oděv. Zasažené části pokožky umyjte podle možností teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě příznaků podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením oka odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče); nevyvolávejte

zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

OZNAČENÍ:**Nebezpečí**

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

obsahuje: kyselina boritá

UFI: M7A0-D0XU-600R-J50G

Pouze pro profesionální uživatele.

ODPOVĚDNOST:

Jelikož skladování a aplikace hnojiva je mimo naší kontroly, můžeme být zodpovědní pouze za uspokojivou kvalitu výrobku v čase dodávky.

Množství: Objem balení: 10 L; 100 L; čistá hmotnost: 14.1 kg; 141 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: AGRO ALIANCE s.r.o. V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel 257 830 138

Výrobce: AGLUKON, Spezialdünger GmbH & Co. KG; Heerdter Landstraße 199 - D-40549 Düsseldorf (Německo).
Telefón: +49 (0) 2 11/50 64 237