

CE

CIGOFOL K

**Vícesložkové kapalně anorganické hnojivo s makroživinami – KfV 1(C)(I)(b)(ii)**

NPK (3-16-21) hnojivo se stopovými živinami v roztoku

|        |                                                                |  |
|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| 3 %    | celkový dusík (N)                                              |  |
| 3 %    | močovinový dusík (N)                                           |  |
| 16 %   | oxid fosforečný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) vodorozpustný |  |
| 21 %   | oxid draselný (K <sub>2</sub> O) vodorozpustný                 |  |
| 0,53 % | bor (B) jako ethanolamin vodorozpustný                         |  |

**SLOŽKY**

Hydrogenorthofosforečnan draselný CAS: 7758-11-4 (KSM1\*), Močovina CAS 57-13-6 (KSM1\*)

\*KSM1: Látky a směsi z původního materiálu.

**NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ**

| Plodina       | Dávka                       | Poznámka                                         |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Polní plodiny | 1 - 2 l/ha<br>200 l vody/ha | 1 – 2 aplikace na plně vyvinutou listovou plochu |
| Zelenina      | 1 - 2 l/ha<br>500 l vody/ha | 1 - 2 aplikací na plně vyvinutou listovou plochu |
| Ovocné stromy | 1 - 2 l/ha<br>200 l vody/ha | 1 - 2 aplikace ve fázi růstu plodů               |
| Vinná réva    | 1 - 2 l/ha<br>200 l vody/ha | 1 - 2 v době tvorby hroznů                       |

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

**UPOZORNĚNÍ**

Nejlepších výsledků se dosáhne rovnoměrným pokrytím povrchu listů postřikem až do stékání. Neaplikujte při vysokých teplotách a silném slunečním záření. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zvláště pokud denní teploty překračují 28 °C. Při aplikaci na mladé listy nebo rostliny pod stresem používejte nižších dávek a odpovídajícím způsobem snižte interval aplikace.

**PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSY**

- Nádrž postřikovače naplňte vodou do poloviny požadovaného množství a zahajte míchání.
- Přidejte požadované množství CIGOFOL K a přidejte zbytek vody. Míchání ponechte nepřetržitě zapnuté. Při kombinaci s ostatními komponentami v nádrži vždy přidejte CIGOFOL K jako poslední. Ujistěte se, aby míchání ostalo zapnuté.
- Po aplikaci důkladně vyčistěte a opláchněte aplikační zařízení.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosah dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

**INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ**

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci. Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoli druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Výrobek není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

### JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

#### První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

#### Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

#### Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

#### Při zasažení očí:

Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

#### Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

**Výrobce:** AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie, tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00

**Distributor:** Agro Alliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, IČ: 61172553, tel: 257 830 138

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech