

CE

WUXAL® SUSPENSION KOMBI Mg

VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI – KfV 1(C)(I)(b)(ii)

Suspenzní hnojivo NK (Mg, S) se stopovými živinami, 20-15 (+4+1,75)

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
20 %	(N) dusík celkový (300 g/l)
4,3 %	dusičnanový dusík (64,5 g/l)
0,5 %	amonný dusík (7,5 g/l)
15,2 %	močovinový dusík (228 g/l)
15 %	(K ₂ O) vodorozpustný oxid draselný (225 g/l)
4 %	(MgO) vodorozpustný oxid hořečnatý (60 g/l)
1,75 %	(SO ₃) vodorozpustný oxid sírový (26,2 g/l)
0,02 %	(B) vodorozpustný bor jako kyselina boritá (0,30 g/l)
0,05 %	(Cu) vodorozpustná měď v chelátu s EDTA* (0,75 g/l)
0,1 %	(Fe) vodorozpustné železo v chelátu s EDTA* (1,50 g/l)
0,05 %	(Mn) vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA* (0,75 g/l)
0,001 %	(Mo) vodorozpustný molybden jako molybdenan sodný (0,015 g/l)
0,05 %	(Zn) vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA* (0,75 g/l)

*Rozsah pH zaručující přijatelnou chelatační stabilitu

Cu-EDTA: 1,5 – 10; Fe-EDTA: 1,5 – 6,5; Mn-EDTA: 3,0 – 8,0; Zn-EDTA: 2,0 – 9,0

SLOŽKY:

Močovina CAS: 57-13-6 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Dusičnan draselný CAS: 7757-79-1 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Chlorid hořečnatý CAS: 7791-18-6 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

Wuxal SUS Kombi Mg je vysoce koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pro aplikaci na list. Hnojivo je možné použít ve všech polních plodinách, v ovocnářství, zelinářství i v okrasném zahradnictví, obzvláště tehdy, kdy je v půdě k dispozici dostatečná zásoba fosforu a rostliny mají zvýšené nároky na hořčík. Může být použit jak preventivně, tak i kurativně, po projevení se příznaků nedostatku hořčíku.

V obilninách je vhodné použít Wuxal SUS Kombi Mg – 2-4x a to v období od odnožování až do metání, dávka 3-5 l/ha.

V kukuřici se hnojivo aplikuje 3x v období mezi fází 2-11 listů, dávka 3-5 l/ha.

V bramborách se aplikuje 3x, poprvé počátkem tvorby poupat (fáze 50), opakuje se počátkem květu a 14 dní poté. Dávka 5 l/ha.

V cukrovce a krmné řepě se aplikuje 3-5x od fáze 4 listů do uzavření řádků, dávka 5 l/ha.

Zelinářství – aplikuje se v koncentraci 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) podle potřeby v kombinaci s běžnými pesticidy.

Okrasné rostliny – aplikuje se v koncentraci 0,05 – 0,1 % (50 – 100 ml na 100 l vody) v kombinaci s běžně používanými pesticidy. V mladších rostlinách a kulturách s měkkými, jemnými listy je vhodné použít spodní hranici uvedené koncentrace.

Chmel – v koncentraci 0,15 % se kombinuje s ošetřením proti peronospoře. Při použití úsporných postřiků nesmí

koncentrace převýšit 0,3 %. Při zvýšené potřebě dávkování zinku lze Wuxal Sus Kombi Mg používat ve směsi se síranem zinečnatým (0,2%). Ošetřuje se 2-4x.

Ovocnářství – aplikace 2-3x v dávce 3-5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy, poprvé v růstové fázi těsně před vytvořením růžového poupěte (E2). V jabloních se v době po odkvětu doporučuje přejít na Wuxal SUS Kalcium.

Vinařství – aplikace v dávce 3-5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy proti peronospoře, celkem 5x.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

Hnojivo je třeba v obalu nejprve pečlivě rozmíchat a poté se vlije přes sítko do nádrže a doplní vodou. Při rozpouštění je třeba udržovat míchadlo neustále v činnosti. Při přípravě směsí s pesticidy se do nádrže vždy vpraví jako první WUXAL a teprve poté se předepsaným postupem dává příslušný pesticid. Hnojivo je fyzikálně a chemicky mísitelné s fungicidy i insekticidy, běžně se nacházejícími na trhu, možnosti míchání je nutno konzultovat s výrobcí pesticidů. Nedoporučujeme jej používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeauxské nebo sírovápenaté jichy a s polysulfidy. Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí WUXAL s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Hnojivo je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzavřených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte produkt před mrazem, teplotami pod +5 °C a nad +40 °C, častými změnami teplot, znečištěním a vyschnutím. Neuchovávejte v kovových obalech (riziko koroze). I krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5 °C může dojít ke změně barvy a vyloučení krystalů. Tato skutečnost není na závadu jeho jakosti, při přípravě aplikační kapaliny dojde ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobku při teplotách okolo +20 °C za občasného promíchání či protřepání.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. (tel.: 257 830 138)

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

Dodržujte pokyny pro doporučené používání tohoto hnojivého výrobku, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.

PRVNÍ POMOC:

Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením oka odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Množství: Objem balení: 100 L; čistá hmotnost: 150 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.257 830 137-8

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landsr. 199, D-40549 Düsseldorf, Německo. Telefon:
+49 (0) 2 11/50 64 237

OZNAČENÍ:

Výrobek není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.