

FERTIAMINO

Organominerální NPK roztokové hnojivo s obsahem aminokyselin a stopových prvků

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre - 3, avenue l'orchidée, 31390 CARBONNE – Francie, Tel: +33 (0)5 61 97 85 00 - Email: agn@agro-nutrition.fr

Dodavatel: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138

Číslo vzájemného uznání: V657

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota (% hmotnostní)
(N) Dusík celkový	9,0 %
(P ₂ O ₅) oxid fosforečný	3,0 %
(K ₂ O) oxid draselný	7,0 %
(MgO) oxid hořečnatý	0,1 %
(B) bor	0,04 %
(Cu) měď	0,01 %
(Fe) železo	0,02 %
(Mn) mangan	0,04 %
(Mo) molybden	0,004 %
(Zn) zinek	0,03 %
Celkové aminokyseliny	2,0 %

Hnojivo obsahuje vedlejší produkty živočišného původu (materiály kategorie 3) zpracovaných podle nařízení ES č. 1069/2009.

Hnojivo nedávat spásat hospodářským zvířatům, neaplikovat na požitelné části rostlin a nepoužívat plodiny jako rostlinná krmiva alespoň 21 dní po aplikaci.

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

Rozsah a způsob použití:

Příjem aminokyselin stimuluje zvýšení fotosyntézy. Aminokyseliny a stopové živiny zlepšují asimilaci půdou přijatých živin.

Používejte k aplikaci na list.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství vody - až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a / nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28 °C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu mohou být náchylnější ke spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikačních termínů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

Doporučené dávkování

plodina	dávka	poznámka
Polní plodiny Obiloviny	5 l/ha (maximální koncentrace směsi 5 %)	Minimálně 1 aplikace Od prodlužování stébla do zduření pochvy praporcového listu Od objevení se praporcového listu
Olejníky, cukrovka	5 l/ha (maximální koncentrace směsi 5 %)	3-4 aplikace v intervalu 15 dnů kdykoliv v průběhu vegetace
Brambor	5 l/ha (maximální koncentrace směsi 5 %)	3-4 aplikace v intervalu 15 dnů od začátku tvorby hlíz
Zelenina	5 l/ha (maximální koncentrace směsi 5 %)	3-4 aplikace v intervalu 15 dnů od začátku vegetativního růstu
Ovocné stromy, školky	5 l/ha (maximální koncentrace směsi 5 %)	4 aplikace v intervalu 15 dnů od opadu květných lupenů
Réva	5 l/ha (maximální koncentrace směsi 5 %)	3-4 aplikace v intervalu 15 dnů. Od stadia oddělování svazků květů, začátkem kvetení a před uzavíráním hroznů.

Míchání / příprava aplikační směsi

Vždy si přečtěte štítek produktu a dodržujte uvedené pokyny výrobce pro všechny produkty. Některá použití, mimo kontrolu výrobce nebo distributora, mohou mít dopad na kvalitu produktů aplikovaných v tank-mix. Proto za výsledek tank-mix aplikace odpovídá koncový uživatel. Při míchání s dalšími složkami v tank-mix přídávejte tento produkt vždy jako poslední. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na výrobce nebo distributora.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, a vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu, popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

OZNAČENÍ:**Varování**

(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.

(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P364) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

(P305+P351+P338) Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P337+P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Respektujte použití, dávky, podmínky a pokyny pro použití uvedené na obalu, které jsou určeny podle charakteristiky produktu a aplikací, pro které se doporučuje. Na tomto základě provádějte ošetření plodiny podle nejlepších zemědělských postupů, přičemž na svou odpovědnost vezměte v úvahu všechny specifické faktory týkající se vaší farmy, jako jsou vlastnosti půdy, povětrnostní podmínky, metody pěstování, kultivary a jejich specifické odolnosti. AGRONUTRITION zaručuje kvalitu svých výrobků pouze v původním obalu po dobu použitelnosti uvedenou na obalu nebo certifikátech výrobce. Zaručují jejich shodu se složením uvedeným na obalu a s platnými předpisy.

Podmínky skladování:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením

Výrobek se dodává balený:

Objem balení: ___ l

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu