

Poradí si s každou **jednoletou trávou** v obilninách

Altivate

Složení: 60 g/kg mesosulfuron-methyl

Výhody:

- vynikající účinek na všechny jednoleté trávy
- podzimní i jarní aplikační okno
- nízké dávkování (mikrogranulát)
- hubí i rezistentní populace

Působení přípravku:

Herbicide ze skupiny sulfonylmočoviny se systémovým účinkem.
Do rostlin proniká přes listovou plochu.

Doporučení pro aplikaci:

Herbicide Altivate aplikujte vždy se směčedlem

Podzimní aplikace (BBCH 11 - BBCH 25) -

- pšenice, tritice, žito – 100 g/ha proti chundelce metlici

Jarní aplikace (BBCH 20 – BBCH 32) –

- pšenice oz., tritice oz. – 150 g/ha proti chundelce metlici a lipnici roční
- pšenice ozimá – 200 g/ha proti ovsu hluchému a jílům
- pšenice ozimá – 250 g/ha proti psárce polní

Regulace růstu **s citem**

Canopy

Složení:

228,86 g/l mepikvát, 42,39 g/l prohexadion

Výhody:

- obsahuje 2 účinné látky s různými mechanismy účinku
- široké aplikační okno
- registrace do všech ozimých obilnin
- výborný partner do TM směsí, zejména s fungicidy

Působení přípravku:

Přípravek snižuje hladinu růstových hormonů – **giberelinů**.

Doporučení pro aplikaci:

Praxí ověřená **dávka 0,6–0,8 l/ha je plně dostačující**, při společné aplikaci s fungicidy na bázi *prothiokonazolu* nebo *tebukonazolu* lze dávku ještě snížit o 0,1 l/ha (T1 aplikační termín)

Přípravek se aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39)