

2
0
2
0



Pendiflex[®] 400

Silwet[®] Gold

Fixa[®] Zn

Kukurica ochrana a listová výživa

Prípravky firmy Agro Aliance SK

*Šetríme Vaše
peniaze!*

S VAMI, PRE VÁS



Pardner 22,5 EC

Bromoxynil 225 g.l⁻¹

- postemergentný herbicíd určený proti dvojkličnolistovým burinám v kukurici
- kontaktný účinok
- aplikácia v rastovej fáze 2-4 pravých listov burín, pri výške kukurice 20 cm
- účinok sa prejavuje do 4-5 dní
- vyššia teplota a slnečný svit zvyšuje účinnosť
- dávka 1,25-1,5 l.ha⁻¹
- dávka vody 400-600 l.ha⁻¹

Merlin 750 WG

Isoxaflutole 750 g.kg⁻¹

- preemergentný herbicíd určený na ničenie jednokličnolistových a dvojkličnolistových burín v kukurici
- má výborný reziduálny účinok v pôde
- aplikujeme do štyroch dní po sejbe
- základná dávka je 100-130 g.ha⁻¹
- dávka vody 200-400 l.ha⁻¹
- pre rozšírenie účinnosti je možné kombinovať s registrovanými prípravkami (podľa etikety prípravku), napr. komb. MERLIN 100-120 g.ha⁻¹ + DUAL GOLD 0,9 l.ha⁻¹

Monsoon

Foramsulfuron 22,5 g.l⁻¹

- postemergentný, selektívny, systémový herbicíd určený na ničenie dvojkličnolistových burín a tráv (vrátane pýru) v kukurici
- účinná látka je prijímaná listami a čiastočne koreňmi
- ošetrované buriny prestávajú ihneď rásť a do 2-4 týždňov odumierajú
- teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda urýchľujú účinok
- aplikujeme vo fáze 2-6 listov kukurice (BBCH 12-16)
- aplikácia na pýr v 3-5 listoch
- dážď po 2 hodinách neznižuje účinnosť
- TM kombinácia s PARDNERom zvyšuje účinnosť na horčičky, mrlík, rumančeky, hluchavku, pohánkovec
- dávka vody 200-400 l.ha⁻¹
- nepoužívať v množiteľských porastoch kukurice
- dávka 2 l.ha⁻¹
- kombinácia MONSOON 2 l.ha⁻¹ + PARDNER 1 l.ha⁻¹
- prípravok obsahuje SAFENER

Pendhiflex 400

Pendhimetalin 400 g.l⁻¹



- dávka 3,3-4,0 l.ha⁻¹
- preemergentná aplikácia (BBCH10 – 11) možná
- kombinácia s prípravkom Merlin (0,10-0,13 kg.ha⁻¹)



INSEKTICÍDY A POMOCNÉ LÁTKY

Delta EW 50

Deltamethrin 50 g.l⁻¹

- insekticídny prípravok určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov v poľnohospodárskej výrobe
- pôsobí ako dotykový a požerový jed
- proti víjačke kukuričnej ošetrujeme 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujeme za 7-10 dní
- dávka - víjačka kukuričná 0,25 l.ha⁻¹
- kukuričiar koreňový 0,25 l.ha⁻¹

Gondor

Lecitin 495 g.l⁻¹

- adjuvant pre použitie v zmesi s herbicídmi a regulátormi rastu
- registrácia vo všetkých plodinách, na ornej, lesnej a nepoľn. pôde vrátane železníc
- zvyšuje príľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi
- zvyšuje penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov
- znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi
- dávka 0,25-0,4 l.ha⁻¹, (max konc. 0,25 %)
- dávka vody: 100-200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,25 l.ha⁻¹
nad 200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,4 l.ha⁻¹
- pri príprave postrekovej zmesi dávajte adjuvant prvý

Silwet Gold

Polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane (80%) Allyloxypolyethyleneglycol (20%)

- neiónové organosilikónové zmáčadlo s vysokoúčinnou schopnosťou znížiť povrchové napätie postrekovej kvapaliny
- zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie postreku
- rýchly prienik do rastliny
- mimoriadne bezpečný pre rastliny
- najbežnejšia dávka je 0,1 l.ha⁻¹, (povolená od 0,025 do 0,15 l.ha⁻¹)

Designer

Karbox. styrén butadién kopolymér 255 g.l⁻¹

- adjuvant pre použitie v zmesi s fungicídmi a insekticídmi, registrovaných do všetkých plodín
- zlepšuje príľnavosť aplikačnej kvapaliny na listoch
- zvyšuje zadržanie kvapaliny na ošetrovanom povrchu
- znižuje straty zmytím dažďovými zrážkami alebo závlahou
- znižuje nežiaduci úlet pri postreku
- dávka 0,1-0,15 l.ha⁻¹, (max. konc. 0,125%)
- dávka vody: 100-200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,1 l.ha⁻¹
nad 200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,15 l.ha⁻¹
- adjuvant pridajte do postrekovej zmesi ako posledný

MIKROHNOJIVÁ

Microstar PZ

Zloženie: N 10 %, P₂O₅ 40 %, SO₃ 11 %, Zn 2 %

- mikrogranulát zabezpečujúci rýchly štart rastu rastlín
- dostatok pohotových živín v prvých týždňoch a mesiacoch
- má výrazný vplyv na úrodu
- jednoduchá manipulácia a nízke dávkovanie
- využiteľnosť živín je oveľa vyššia v porovnaní s klasickými hnojivami
- lepšie prekonávanie stresu v prípade nepriaznivých klimatických podmienok (časté striedanie teplôt v priebehu jari)



Wuxal Microplant

**VITAMÍNOVA
BOMBA!**

Zloženie: N celkový 5 %, K₂O 10 %, MgO 3 %, B 0,3 %, Cu 0,5 %, Fe 1,0 %, Mn 1,5 %, Mo 0,01 %, Zn 1,0 %, S 5,2 %, katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

- špeciálne hnojivo s vysokým obsahom mikroprvkov
- hnojivo vhodné na odstránenie akútneho nedostatku živín a pre preventívne použitie
- aplikácia 1-2x (vo fáze 2-6 listov) v dávke 1 l.ha⁻¹

Wuxal Super

Zloženie: N celkový 8 % (z toho vo forme dusičnanej 2,3 %, amónnej 3,7 % a močovinatej 2,0 %), P₂O₅ 8 %, K₂O 6 %, B 0,01 %, Cu 0,004 %, Fe 0,02 %, Mn 0,012 %, Mo 0,001 %, Zn 0,004 %, katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

- je výborne znášajú a ľahko prijímaný rastlinami
- má výbornú pufrovaciu schopnosť
- možnosť kombinácií s bežnými pesticídmi
- dávka 3-5 l.ha⁻¹



Fixa Zn

Zloženie: Zn (120 g.l⁻¹) rozpustný vo vode, 9 %, oxid sírový 145 g.l⁻¹, 11%

- hnojivo ES
- dávka 1-2 l.ha⁻¹ (minimálna koncentrácia 1%)
- 1 až 2 aplikácie od 5-6 listov, dávka vody 200 l a viac
- balenie 10 l kanistre
- neaplikujte pri teplote vyššej ako 28 °C



Táto publikácia má informatívny charakter. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Poradenstvo

Ing. Ján Gajdoš

Hlavná 79
925 28 Pusté Úľany
mobil: 0915 781 289
e-mail: j.gajdos@agroaliance.sk

Ing. Juraj Sakáč

Sídliisko Žitava 1401/10
952 01 Vráble
mobil: 0904 103 433
e-mail: j.sakac@agroaliance.sk

Ing. Ladislav Orságh

J. Fándlyho 24
919 43 Cífer
mobil: 0903 457 967
e-mail: l.orsagh@agroaliance.sk